



فهرست دارونامه



دستگاه تنفسی



گوارش و کبد



تناسب اندام



عضلانی، اسکلتی و ضد درد



اعصاب و روان



دستگاه قلب و عروق، غدد



پوست و مو





شربت زوفا



شربت کمون



شربت رسپیکالم



شربت اسکویلا



کپسول زنیان پلاس نیاک



برگشت به فهرست اصلی

شربت زوفا پلاس نیاک

<i>Hyssopus officinalis</i>	Hyssop	زوفا
<i>Ziziphus jujuba Mill</i>	Jujube	عناپ
<i>Cordia myxa L</i>	Cordia fruit	سپستان
<i>Ficus carica L</i>	Fig	انجیر زرد
<i>Viola odorata L</i>	Sweet violet	گل بنفشه
<i>Marrubium vulgare</i>	White horehound	فراسیون
<i>Adiantum capillus-veneris L</i>	Maidenhair	پرسیاوشان
<i>Glycyrrhiza glabra L</i>	Liquorice	شیرین بیان
<i>Alcea lavateriflora L</i>	Marshmallow	ختمی
<i>Malva neglecta L</i>	Mallow	پنیرک

مواد جانبی: عسل مصفی

- بسته بندی:
شربت در بطری های ۱۲۰ میلی لیتری در جعبه بروشوردار.

■ معرفی فرآورده:
در ساخت این شربت از گیاهان مختلفی استفاده شده که باعث می شود چندین خاصیت از جمله رفع سرفه و تنگی نفس، نرم کنندگی سینه و خلط آوری را با هم نشان دهد. مهم ترین گیاه آن زوفا است و برای آن خاصیت کمک به بهبود مشکلات تنفسی قائلند. از دیگر گیاهان مهم آن می توان به ختمی، پنیرک، عناپ و شیرین بیان اشاره کرد که خواص ضد سرفه و نرم کننده سینه دارند. در مطالعه بالینی انجام شده در بیمارستان بقیه الله تهران توسط متخصصین نشان داده شد در مصدومین شیمیایی اثرات قابل قبولی جهت رفع سرفه مزمن و برطرف نمودن مشکلات تنفسی داشته و از این رو کیفیت زندگی این افراد را تا سطح قابل قبولی بالا برده است.

- این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۰/۹ میلی گرم ترکیبات فنلی تام بر حسب گالیک اسید در هر میلی لیتر استاندارد گردیده است.

■ مکانیسم اثر:
مواد موثره موجود در زوفا می تواند باعث افزایش ترشحات در مجاری تنفسی شود. ختمی، پنیرک و عناپ نیز حاوی موسیلاژ هستند که باعث نرم شدن سینه و خلط آوری می شوند.

■ موارد مصرف:
بهبود سرفه و تنگی نفس، کاهش ترشحات پشت حلق، تسکین درد سینه و رفع صلابت معده.

- مقدار و نحوه مصرف:
طبق دستور پزشک و یا افراد ۶ الی ۱۲ سال: ۱ قاشق غذاخوری، ۳ تا ۴ بار در روز.
بزرگسالان: ۲ قاشق غذاخوری، ۳ تا ۴ بار در روز.

■ عوارض جانبی:
ممکن است در مقادیر مصرفی بالا باعث برخی مشکلات گوارشی شود.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:
در صورت مشاهده و یا بروز هر گونه حساسیت به ترکیبات دارو از مصرف آن خودداری نمایید.
به دلیل وجود ترکیبات گیاهی ایجاد رسوب در شربت عادی می باشد. قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید. برای اثربخشی بهتر، دوره ی مصرف دارو را کامل کنید.
به دلیل وجود گیاه زوفا، در افراد با سابقه تشنج، احتیاط مصرف دارد و تحت نظر پزشک مصرف گردد.
به دلیل وجود شیرین بیان، مصرف طولانی مدت و یا دوزهای بالاتر از مقادیر تجویز شده در افراد دچار پرفشاری خون توصیه نمی گردد.
در کودکان زیر ۶ سال توصیه نمی گردد و جهت مصرف برای کودکان ۶ تا ۱۲ سال با تجویز و تحت نظر پزشک صورت گیرد.

■ تداخلات دارویی:
مصرف همزمان این فرآورده با داروی دیگوسکین با احتیاط و تحت نظر پزشک صورت گیرد.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:
از نظر بررسی ایمنی به اثبات نرسیده، ولی لازم است با احتیاط و زیر نظر پزشک معالج مصرف شود.

■ شرایط نگهداری:
دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید.
دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



**Zofa plus Niak
syrup**

شربت کمون

<i>Zataria multif</i>	Zataria	آویشن شیرازی
<i>Trachyspermum copticum</i>	Ammi	زنیان
<i>Carum carvi L.</i>	Black Caraway	زیره کرمانی
<i>Foeniculum vulgare</i>	Fennel	رازیانه
<i>Pimpinella anisum</i>	Aniseed	انیسون
<i>Mentha longifolia</i>	Horsemint	پونه
<i>Boswellia serrata</i>	Frankincense	کندر
<i>Mentha spicata</i>	Spearmint	نعناع خشک

مواد جانبی: عسل مصفی.

■ بسته بندی: شربت در بطری های ۱۲۰ میلی لیتری در جعبه بروشوردار.

■ معرفی فرآورده: گیاهان به کار رفته در این فرآورده سنتی اثرات مختلفی از قبیل ضد نفخ، رفع سسکه، حالت تهوع و بهبود سرفه را دارند.

■ این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۰/۰۰۹ درصد ترکیبات فنلی بر حسب تیمول استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر: زیره به دلیل وجود کاروون و لیمونن جهت سوهاضمه مفید است. پونه به دلیل وجود پیپریتون، منتول و لیمونن در اسانس خود دارای خاصیت ضد نفخ می باشد. نعناع به دلیل دارا بودن کاروون و کاریو فیلن دارای اثرات ضد اسپاسم گوارشی و ضد نفخ می باشد.

در مطالعه ای مشخص شد گیاه زاتاریا (آویشن شیرازی) توانایی بهبود عملکرد ریه و شاخص های مربوط به آن مانند Forced Vital Capacity (حجم حیاتی اجباری) را دارد و می تواند در رفع تنگی نفس موثر باشد. این گیاه با اثر مهاري بر روی گیرنده های موسکارینی و هیستامینی و اثر تحریکی بر گیرنده های بتا توانایی اتساع برونش ها و رفع سرفه را دارد. آویشن شیرازی و زنیان حاوی تیمول می باشند که هم باعث بروز اثرات ضد سرفه و هم ضد اسپاسم آن ها می شود.



موارد مصرف: ضد سرفه، برطرف کننده سسکه و حالت تهوع، تقویت کننده معده.

■ مقدار و نحوه مصرف:

اطفال زیر ۶ سال: نصف قاشق غذاخوری بعد از هر وعده غذا.
اطفال بیش از ۶ سال: یک قاشق غذاخوری بعد از هر وعده غذا.
بزرگسالان: دو قاشق غذاخوری بعد از هر وعده غذا.
اطفال زیر دو سال تنها با تجویز پزشک.

■ عوارض جانبی:

تا کنون عوارض جانبی خاصی از این شربت گزارش نشده است. در صورت حساسیت به هر یک از اجزای گیاهی فرآورده، امکان بروز بثورات جلدی وجود دارد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- در صورت مشاهده یا بروز حساسیت به ترکیبات دارو، از مصرف آن خودداری کنید.
- به دلیل وجود ترکیبات گیاهی ایجاد رسوب در بطری عادی می باشد.
- قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید.
- از آنجایی که اثر درمانی داروهای گیاهی به کندی ظاهر می گردد، حتماً برای حصول نتیجه کامل و اثرات بهتر درمان، دوره مصرف دارو کامل گردد.
- پس از تکمیل درمان در صورت باقی ماندن شربت مابقی آن را دور بریزید.

■ تداخلات دارویی:

عوارض ناخواسته ای از مصرف همزمان شربت با سایر داروها گزارش نشده است.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف نگردد مگر با تجویز پزشک.

■ شرایط نگهداری:

در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری شود.
دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.

کمون

شربت

تقویت کننده معده
ضد نفخ
برطرف کننده سسکه و ضد تهوع



آموزش فرآوری: زنیان، زیره کرمانی، رازیانه، انیسون، پونه، نعناع، صندل، فلفل، سیاه.
۱۲۰ میلی لیتر

Cumon
Syrup

شریت رسیکالم

Thymus vulgaris	Thyme	عصاره مایع آویشن
Hedera helix	Ivy leaf	شیرین بیان

مواد جانبی: عسل، سدیم سیترات دی هیدرات، متیل پارابن، پروپیل پارابن، پروپیلن گلیکول، سدیم کریوکسی متیل سلولز

■ بسته بندی:
شریت در بطری های ۱۲۰ میلی لیتری در جعبه برشوردار.

■ این فرآورده حاوی الکل است.

■ معرفی فرآورده:
هر بطری ۱۲۰ میلی لیتری شریت حاوی ۲۰ گرم عصاره مایع آویشن با نام علمی *Thymus vulgaris* و ۲ گرم عصاره پیچک با نام علمی *Hedera helix* است که از دیرباز جهت درمان علایم سرفه و برونشیت مورد استفاده قرار می گرفته اند.

■ - این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۰/۱ درصد ترکیبات فنولی تام برحسب تیمول استاندارد شده است.

■ - این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۲ میلی گرم هیدروکوزید C در ۱۰۰ میلی لیتر از آن استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:
گیاه آویشن به دلیل داشتن تیمول، کارواکرول و ترکیبات فنولی دارای اثرات ضدالتهابی، ضداسپاسم مجاری تنفسی و ضد میکروبی می باشد.



موارد مصرف:
برطرف کننده علایم برونشیت حاد و سرماخوردگی، خلط آور و تسکین دهنده سرفه.


■ مقدار و نحوه مصرف:
کودکان ۱ تا ۵ سال: روزانه ۳ بار، هر بار ۳ میلی لیتر.
کودکان ۶ تا ۱۱ سال: روزانه ۳ بار، هر بار ۴ میلی لیتر.
افراد ۱۲ سال به بالا و بزرگسالان: روزانه ۳ بار، هر بار ۵ میلی لیتر.

■ عوارض جانبی:
ممکن است باعث بروز ناراحتی گوارشی گردد.
در برخی موارد ممکن است باعث ایجاد حساسیت و واکنش های آلرژیک گردد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:
- در صورت ادامه یافتن علائم بیماری به بیش از یک هفته و همچنین وجود تنگی نفس، تب یا وجود خلط چرکی، در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایند.
- در افراد با مشکلات انعقادی خون، مصرف طولانی مدت آن توصیه نمی شود.
- شریت رسی کالم حاوی ۶ درصد حجمی/حجمی الکل است. این فرآورده نباید در بیماران الکلی استفاده شود.
- در صورت ادامه یافتن علایم بیماری حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
- افراد دچار التهابات گوارشی و زخم معده بهتر است قبل از مصرف فرآورده به پزشک خود اطلاع دهند.
- در کودکانی که بیش از مقدار توصیه شده، رسیکالم دریافت کرده اند و در بیماری که در ریسک بالا هستند، مانند بیماران با مشکلات کبدی و مبتلایان به سرع باید میزان الکل موجود در فرآورده مد نظر قرار گیرد.
- قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:
مصرف نگردد و یا قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

■ شرایط نگهداری:
دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید.
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



Respicalm
syrup

شربت اسکوویلا

Urginea mantripitima

Squill

پیاز عنصل

مواد جانبی: سرکه، عسل.

■ بسته بندی:

شربت در بطری های ۲۰۰ میلی لیتری در جعبه بروشوردار.

■ مکانیسم اثر:

در مطالعه ای بر روی گونه های مختلف پیاز عنصل وجود فیتو استرول ها، ترکیبات فنولی مانند سیانیدین و کافئیک اسید و ترکیبات فلاونوئیدی مانند کوئرستین و ویتکسین در این گیاه اثبات شد و همچنین مشاهده شد این گیاه خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و در کاهش کلسترول، تری گلیسرید و افزایش HDL موثر است همچنین خاصیت رفع سرفه آن را می توان به وجود برخی ترکیبات موسیلاژی نسبت داد.

■ - این فرآورده براساس وجود حداقل ۵/۰ میلی گرم ترکیبات فنلی تام برحسب گالیک اسید در هر میلی لیتر استاندارد شده است.



موارد مصرف:

- داروی کمکی در درمان کبد چرب و تنظیم کننده آنزیم های کبدی.
- پایین آورنده چربی خون و تری گلیسرید.
- بازکننده انسداد کبدی.
- در طب سنتی به اثر آن در رفع سرفه های مزمن و تنگی نفس اشاره شده است.
- سستی و التهاب طحال.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق نظر پزشک و یا در ابتدای درمان ۲ قاشق غذاخوری در روز به صورت ناشتا همراه با آب ولرم و در ادامه به تدریج تا ۵ قاشق غذاخوری بصورت ناشتا افزایش داده شود.

■ عوارض جانبی:

- در دوزهای بالا ممکن است منجر به سقط جنین گردد.
- در برخی موارد ممکن است به دلیل وجود سرکه در فرآورده باعث تحریک معده در افراد دچار زخم گوارشی گردد.
- ممکن است باعث تحریک اعصاب گردد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- در افراد دچار مشکلات قلبی بهتر است با احتیاط مصرف شود.
- به دلیل وجود ترکیبات گیاهی ایجاد رسوب در شربت عادی می باشد. قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید.
- در صورت حساسیت به اجزاء فرآورده مصرف نگردد.
- در هنگام استفاده از تیازیدها، دیورتیک ها و ملین ها می بایست با احتیاط مصرف گردد.
- مصرف همزمان با آهن و فرآورده های حاوی آهن ممنوع می باشد.
- در موارد ابتلا به زخم های داخلی و تب نباید مورد استفاده قرار گیرد.

■ تداخلات دارویی:


ممکن است اثرات تشدید کننده با گلیکوزیدهای قلبی از قبیل دیگوسین یا داروهای قلبی دیگر داشته باشد.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:

مجاز نمی باشد.

■ شرایط نگهداری:

دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید.
دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.



200 ml

Squilla Oxymel
Syrup

کپسول

زنیان پلاس نیاک

<i>Trachyspermum copticum</i>	Ammi	زنیان
<i>Zataria multiflora</i>	Zataria	آویشن شیرازی
<i>Nigella sativa</i>	Black cumin	سیاه دانه
<i>Pistacia lentiscus</i>	Mastic	مصطکی

مواد جانبی: عسل مصفی.

■ بسته بندی:

۱۰۰ عدد کپسول در بسته بندی قوطی همراه با جعبه بروشوردار.

■ معرفی فرآورده:

ترکیبی است حاوی گیاهانی همچون آویشن، زنیان و سیاه دانه که خاصیت تقویتی معده و ضد نفخ قوی دارند. ضمناً به دلیل وجود تیمول در آویشن و زنیان، این فرآورده می تواند ضد سرفه نیز باشد. استاندارد شده بر اساس حداقل ۲/۵ میلی گرم ترکیبات فنلی تام بر حسب تیمول در هر کپسول.

■ مکانیسم اثر:

زنیان و آویشن شیرازی حاوی مقادیر قابل توجهی تیمول و کاراکرول هستند که باعث افزایش ترشح موکوس و صفرا و آنزیم های گوارشی می شوند که در نهایت به بهبود فعالیت گوارشی و جلوگیری از ایجاد زخم گوارشی می انجامد. همچنین این مواد موثره خاصیت آنتی باکتریال و ضد قارچ دارند و در مطالعه ای اثر مناسبی علیه هلیکوباکتر پیلوری از خود نشان دادند.

در تحقیقی اثرات آنتی کولینرژیک عصاره زنیان بررسی شد و مشاهده شد که مواد موجود در عصاره می تواند به صورت آنتاگونیست رقابتی بر گیرنده های استیل کولین عمل کند و باعث کاهش اسپاسم روده ای شود. همچنین این گیاه به همراه آویشن در برخی مطالعات خاصیت برونکودیلاتوری و آنتی هیستامینی از خود بروز داده و در مشکلات تنفسی و سرفه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.



■ موارد مصرف:

- برطرف کننده نفخ.
- برطرف کننده ورم معده و روده.
- برطرف کننده احساس پری معده.
- برطرف کننده رفلاکس معده.
- در کتب طب سنتی این فرآورده جهت درمان سستی معده و سردی مزاج و ضد استرخا و جهت دفع بلغم استفاده می شود.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق دستور پزشک و یا ۱ عدد کپسول صبح ناشتا و یک کپسول شب هنگام خواب مصرف گردد.

■ عوارض جانبی:

در برخی موارد نادر ممکن است باعث مشکلات گوارشی گردد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه :

در صورت وجود حساسیت به هر یک از اجزا از مصرف دارو خودداری شود.

■ تداخلات دارویی:

مصرف این فرآورده با داروهای ضد انعقاد خون احتیاط مصرف دارد .

■ مصرف در بارداری:

به دلیل وجود گیاهانی همچون زنیان و آویشن شیرازی و داشتن تیمول فراوان، توصیه نمی شود.

■ مصرف در شیردهی:

طبق نظر پزشک معالج مصرف گردد؛ ممکن است باعث تغییر در طعم شیر گردد.

■ شرایط نگهداری:

دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید. دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.



Zenian Plus Niac
Capsule



قرص آلوئه پلاس



شریت اسکویلا



قرص کوری تریپ



شریت فیژیلاکس



کپسول گوگاتریپ



شریت کمون



قرص سیمپل تریپ



شریت نیاک
لیور اکسیمیل



کپسول زنیان
پلاس نیاک



شریت نیاک یری



پودر ماءالجین



قرص نیاک گستریکس
(دوای بلغم)



قرص سینارول



برگشت به فهرست اصلی

شربت اسکوویلا

Urginea mantripitima

Squill

پیاز عنصل

مواد جانبی: سرکه، عسل.

■ بسته بندی:

شربت در بطری های ۲۰۰ میلی لیتری در جعبه بروشوردار.

■ مکانیسم اثر:

در مطالعه ای بر روی گونه های مختلف پیاز عنصل وجود فیتو استرول ها، ترکیبات فنولی مانند سیانیدین و کافئیک اسید و ترکیبات فلاونوئیدی مانند کوئرستین و ویتکسین در این گیاه اثبات شد و همچنین مشاهده شد این گیاه خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و در کاهش کلسترول، تری گلیسرید و افزایش HDL موثر است همچنین خاصیت رفع سرفه آن را می توان به وجود برخی ترکیبات موسیلاژی نسبت داد.

■ - این فرآورده براساس وجود حداقل ۵/۰ میلی گرم ترکیبات فنلی تام برحسب گالیک اسید در هر میلی لیتر استاندارد شده است.



موارد مصرف:

- داروی کمکی در درمان کبد چرب و تنظیم کننده آنزیم های کبدی.
- پایین آورنده چربی خون و تری گلیسرید.
- بازکننده انسداد کبدی.
- در طب سنتی به اثر آن در رفع سرفه های مزمن و تنگی نفس اشاره شده است.
- سخی و التهاب طحال.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق نظر پزشک و یا در ابتدای درمان ۲ قاشق غذاخوری در روز به صورت ناشتا همراه با آب ولرم و در ادامه به تدریج تا ۵ قاشق غذاخوری بصورت ناشتا افزایش داده شود.

■ عوارض جانبی:

- در دوزهای بالا ممکن است منجر به سقط جنین گردد.
- در برخی موارد ممکن است به دلیل وجود سرکه در فرآورده باعث تحریک معده در افراد دچار زخم گوارشی گردد.
- ممکن است باعث تحریک اعصاب گردد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- در افراد دچار مشکلات قلبی بهتر است با احتیاط مصرف شود.
- به دلیل وجود ترکیبات گیاهی ایجاد رسوب در شربت عادی می باشد. قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید.
- در صورت حساسیت به اجزاء فرآورده مصرف نگردد.
- در هنگام استفاده از تیازیدها، دیورتیک ها و ملین ها می بایست با احتیاط مصرف گردد.
- مصرف همزمان با آهن و فرآورده های حاوی آهن ممنوع می باشد.
- در موارد ابتلا به زخم های داخلی و تب نباید مورد استفاده قرار گیرد.

■ تداخلات دارویی:


ممکن است اثرات تشدید کننده با گلیکوزیدهای قلبی از قبیل دیگوسین یا داروهای قلبی دیگر داشته باشد.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:

مجاز نمی باشد.

■ شرایط نگهداری:

دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید.
دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.



Squilla Oxymel
Syrup

شربت

فیژیلاکس

<i>Ficus carica</i>	Fig	انجیر خشک
<i>Vitis vinifera</i>	Raisins	مویز
<i>Cordia myxa</i>	Cordia fruit	سپستان
<i>Cassia fistula</i>	Golden shower tree fruit	خیار چنبر(فلوس)
<i>Alhagi maurorum</i>	Mana of hedysarum	ترنجبین
<i>Amygdalus communis var. Dulcis</i>	Sweet almond oil	روغن بادام شیرین
	Purified honey	عسل

■ بسته بندی:
شربت در بطری های ۱۲۰ میلی لیتری در جعبه برشودار.

■ معرفی فرآورده:
انجیر: انجیر از نظر طب سنتی گرم و تر است و یکی از بهترین میوه ها برای تمیز کردن روده بزرگ و از بین بردن یبوست می باشد. مواد تشکیل دهنده ی انجیر شامل مواد قندی، مواد ازته، چربی، مواد معدنی، اسیدهای آمینه و آنزیم های مختلف می باشد. فلوس: فلوس نیز از نظر طب سنتی گرم و تر است و مصرف آن عوارضی ندارد. روغن بادام شیرین: از نظر طب سنتی گرم و تر است و جهت رفع یبوست از آن استفاده می شود. این روغن شامل بیش از ۷۵ درصد اسیدهای چرب غیر اشباع، مواد معدنی و ویتامین های مختلف می باشد.

■ - این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۱۵ درصد قندهای احیایی بر حسب مالتوز استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:
انجیر حاوی فیبر فراوان، موسیلاژ و ترکیبات قندی است و باعث افزایش حجم دفع می شود و در نتیجه موجب کاهش دفعات یبوست و هموروئید می گردد.



■ موارد مصرف:
- رفع یبوست کودکان (بالای دو سال) بدون عوارض گوارشی و دلپیچه. همچنین طعم خوشایند این فرآورده امکان مصرف راحت برای کودکان را فراهم آورده است.
- یبوست مزمن در افراد سالخورده.
- علاج قولنج ثقلی، ملین طبع و مفید در درمان یبوست حاد و مزمن مخصوصا در افراد سالخورده و در زنان باردار و شیرده.
- نافع در ربو و سرفه های خشک، رفع ضعف کلیه ها و تقویت نیروی جنسی.

■ مقدار و نحوه مصرف:
طبق دستور پزشک و یا کودکان: ۱ قاشق غذاخوری، ۱ تا ۲ بار در روز.
بزرگسالان: ۱ تا ۲ قاشق غذاخوری، ۲ بار در روز.

■ عوارض جانبی:
مصرف طولانی مدت دارو و لینت شدید ممکن است باعث اختلال در تعادل آب و املاح بدن بویژه پتاسیم شود که منجر به اختلال در عملکرد قلب و ضعف ماهیچه ای می شود.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه :
- در صورت مشاهده و یا بروز هر گونه حساسیت به ترکیبات دارو از مصرف آن خودداری نمایید.
- قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید.
- بهتر است برای اثر بخشی سریعتر، میزان آشامیدن آب به ۶ لیوان در طول روز افزایش یابد.

■ تداخلات دارویی:
- مصرف همزمان دارو با دیگر ملین ها ممکن است باعث تشدید اثرات شود.
- به علت احتمال کاهش سطح پتاسیم، مصرف طولانی مدت این دارو با برخی از دارو ها مانند دیگوکسین، مدرها و وارفارین باید با احتیاط مصرف شود.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:
توصیه می گردد با تجویز پزشک و با احتیاط مصرف گردد.

■ شرایط نگهداری:
دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰ °C) و دور از نور نگهداری کنید.
دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



Figilax
syrup

شربت کمون

<i>Zataria multif</i>	Zataria	آویشن شیرازی
<i>Trachyspermum copticum</i>	Ammi	زنیان
<i>Carum carvi L.</i>	Black Caraway	زیره کرمانی
<i>Foeniculum vulgare</i>	Fennel	رازیانه
<i>Pimpinella anisum</i>	Aniseed	انیسون
<i>Mentha longifolia</i>	Horsemint	پونه
<i>Boswellia serrata</i>	Frankincense	کندر
<i>Mentha spicata</i>	Spearmint	نعناع خشک

مواد جانبی: عسل مصفی.

■ بسته بندی: شربت در بطری های ۱۲۰ میلی لیتری در جعبه بروشوردار.

■ معرفی فرآورده: گیاهان به کار رفته در این فرآورده سنتی اثرات مختلفی از قبیل ضد نفخ، رفع سسکسه، حالت تهوع و بهبود سرفه را دارند.

■ این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۰/۰۰۹ درصد ترکیبات فنلی بر حسب تیمول استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر: زیره به دلیل وجود کاروون و لیمونن جهت سوهاضمه مفید است. پونه به دلیل وجود پیپریتون، منتول و لیمونن در اسانس خود دارای خاصیت ضد نفخ می باشد. نعناع به دلیل دارا بودن کاروون و کاریو فیلن دارای اثرات ضد اسپاسم گوارشی و ضد نفخ می باشد. در مطالعه ای مشخص شد گیاه زاتاریا (آویشن شیرازی) توانایی بهبود عملکرد ریه و شاخص های مربوط به آن مانند Forced Vital Capacity (حجم حیاتی اجباری) را دارد و می تواند در رفع تنگی نفس موثر باشد. این گیاه با اثر مهاري بر روی گیرنده های موسکارینی و هیستامینی و اثر تحریکی بر گیرنده های بتا توانایی اتساع برونش ها و رفع سرفه را دارد. آویشن شیرازی و زنیان حاوی تیمول می باشند که هم باعث بروز اثرات ضد سرفه و هم ضد اسپاسم آن ها می شود.



موارد مصرف: ضد سرفه، برطرف کننده سسکسه و حالت تهوع، تقویت کننده معده.

■ مقدار و نحوه مصرف:

اطفال زیر ۶ سال: نصف قاشق غذاخوری بعد از هر وعده غذا.
اطفال بیش از ۶ سال: یک قاشق غذاخوری بعد از هر وعده غذا.
بزرگسالان: دو قاشق غذاخوری بعد از هر وعده غذا.
اطفال زیر دو سال تنها با تجویز پزشک.

■ عوارض جانبی:

تا کنون عوارض جانبی خاصی از این شربت گزارش نشده است. در صورت حساسیت به هر یک از اجزای گیاهی فرآورده، امکان بروز بثورات جلدی وجود دارد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- در صورت مشاهده یا بروز حساسیت به ترکیبات دارو، از مصرف آن خودداری کنید.
- به دلیل وجود ترکیبات گیاهی ایجاد رسوب در بطری عادی می باشد.
- قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید.
- از آنجایی که اثر درمانی داروهای گیاهی به کندی ظاهر می گردد، حتماً برای حصول نتیجه کامل و اثرات بهتر درمان، دوره مصرف دارو کامل گردد.
- پس از تکمیل درمان در صورت باقی ماندن شربت مابقی آن را دور بریزید.

■ تداخلات دارویی:

عوارض ناخواسته ای از مصرف همزمان شربت با سایر داروها گزارش نشده است.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف نگردد مگر با تجویز پزشک.

■ شرایط نگهداری:

در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری شود. دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.

کمون

شربت

تقویت کننده معده
ضد نفخ
برطرف کننده سسکسه و ضد تهوع



آموزش مصرف دارو:
آویشن شیرازی، زنیان، زیره کرمانی، رازیانه،
انیسون، پونه، نعناع، صندل، فلفل، سیاه

۱۲۰ میلی لیتر

Cumon
Syrup

شربت نیاک لیور اکسیمل

<i>Foeniculum vulgare</i>	Fennel	رازیانه (دانه و ریشه)
<i>Cuscuta monogyna</i>	Chinese dodder	کشوث
<i>Pimpinella anisum</i>	Aniseed	انیسون
<i>Rosa damascena</i>	Red rose	گل سرخ
<i>Cichorium intybus</i>	Chicory	کاسنی (دانه ریشه)
<i>Cucumis sativus</i>	Cucumber seed	تخم خیار سبز
<i>Cucumis melo var. flexuosus</i>	Cucumber (kakra) seed	تخم خیار چنبر
<i>Cucumis melo var. inodorus</i>	Melon seed	تخم خربزه
<i>Apium graveolens</i>	Celery seed	تخم کرفس
<i>Capparis spinosa</i>	Caper seed	تخم کبر
<i>Glycyrrhiza glabra</i>	Liquorice	شیرین بیان
<i>Ziziphus vulgaris</i>	Jujube	عناب

مواد جانبی: شکر، سرکه انگور.

■ بسته بندی:
شربت در بطری های ۲۰۰ میلی لیتری در جعبه بروشوردار.

■ - این فرآورده براساس وجود حداقل ۰/۴ میلی گرم ترکیبات فنلی تام بر حسب گالیک اسید در هر میلی لیتر استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:
رازیانه حاوی ماده موثره آنتول و انیسون نیز دارای ترانس آنتول، انیس آلدهید و مشتقات کافئیک اسید است. طبق مطالعات روغن قرار این دو گیاه خاصیت محافظت از کبد و پایین آوردن آنزیم های ALT, AST, ALP را در کبد چرب دارند. همچنین می توانند باعث کاهش کلسترول و تری گلیسرید شوند.
گل سرخ حاوی فلاونوئید قابل توجهی است و توان اکسیدانی بالایی دارد. تخم کبر و تخم خربزه حاوی ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی می باشد و توان آنتی اکسیدانی نسبتا بالایی دارد. تخم کرفس و کاسنی نیز در مطالعات اثرات محافظتی از کبد از خود بروز داده اند.



موارد مصرف:
- ترمیم کننده و تقویت کننده ی کبد و موثر در پیشگیری از اختلالات کبدی.
- جهت رفع تب های کهنه و مرکبه و دفع صفرای غلیظ و استسقای حار.

■ مقدار و نحوه مصرف:
طبق دستور پزشک و یا روزی ۱ الی ۲ مرتبه، ۳ قاشق غذاخوری از شربت به همراه آب میل گردد.

■ عوارض جانبی:
ممکن است در برخی افراد باعث ناراحتی گوارشی گردد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:
- در صورت وجود حساسیت به هر یک از اجزا، با احتیاط مصرف گردد.
- به دلیل وجود شیرین بیان در فرآورده، در افراد دچار فشار خون بالا، مصرف مقدار بیش از حد توصیه شده آن مجاز نمی باشد.
- به دلیل برخی ترکیبات رازیانه که اثرات استروژنیک دارند در افراد مبتلا به سرطان سینه، رحم و تخمدان توصیه نمی گردد.
- برای اثر بخشی بهتر می توان از عرق شاهتره و یا کاسنی به جای آب استفاده نمود.
- با داروهای کورتیکواستروئید و دیورتال های قلبی به صورت همزمان مصرف نگردد.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:
با احتیاط و تحت نظر پزشک مصرف گردد.

■ شرایط نگهداری:
دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید.
دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



Niak liver oxmel
Syrup

شربت نیاک بری

<i>Berberis vulgaris</i>	Barberry	زرشک (میوه)
<i>Foeniculum vulgare</i>	Fennel	رازیانه (میوه و ریشه)
<i>Pimpinella anisum</i>	Aniseed	انیسون (میوه)
<i>Apium graveolens</i>	Celery	کرفس (تخم و ریشه)
<i>Cuscuta monogyna</i>	Chinese dodder	کشوت (تخم)
<i>Cichorium intybus</i>	Chicory	کاسنی (گل)
<i>Elettaria cardamomum</i>	Cardamom	هل (دانه)
<i>Zingiber officinale</i>	Ginger	زنجبیل (ریزوم)

مواد جانبی: شکر سرخ.

■ بسته بندی:

شربت در بطری های ۲۰۰ میلی لیتری در جعبه برشوردار.

■ معرفی فرآورده:

این فرآورده، حاوی گیاهانی از جمله زرشک و زنجبیل است که باعث افزایش اشتها می شوند. هل باعث تسریع هضم غذا و جلوگیری از سوء هاضمه می گردد. افزون براین زنجبیل دارای اثرات ضد تهوع و استفراغ مخصوصا در دوران بارداری می باشد. در طب سنتی در مورد این فرآورده به مواردی همچون مقوی معده و هاضمه، مسهل صفراوی رقیق معده اشاره شده است.

■ - این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۰/۷ میلی گرم ترکیبات فنولی تام برحسب گالیک اسید در هر میلی لیتر استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:

زرشک حاوی آنتوسیانین و اسیدهای میوه است و باعث بهبود ترشح صفرا می شود. هل حاوی مواد مؤثره سینئول، لینالیل استات و اسیدهای چرب است و باعث افزایش ترشح صفرا و اشتها می شود. رازیانه حاوی ماده مؤثره آنتول و انیسون نیز دارای ترانس آنتول و مشتقات کافئیک اسید می باشد و طبق مطالعات روغن های فرار این دو گیاه خاصیت محافظت از کبد و کاهش آنزیم های کبدی در بیماری کبد چرب را دارند. زنجبیل دارای ماده مؤثره جینجرول است و باعث افزایش اشتها، جلوگیری از تهوع و تحریک سیستم ایمنی می گردد.



■ موارد مصرف:

مفید در مشکلات کبدی، صفراوی و گوارشی (مفتح سده های کبد، نافع برای حمایت مزمنه و سوء القنیه و استسقا و یرقان).

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق دستور پزشک و یا ۲ قاشق غذاخوری ۳۰ دقیقه قبل از هر وعده غذایی میل شود.

■ عوارض جانبی:

در برخی موارد نادر و در افراد حساس به گیاه زرشک ممکن است باعث بروز حساسیت و درماتیت گردد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- در صورت بروز حساسیت به هریک از اجزای فرآورده از مصرف آن خودداری نمایید.
- ممکن است شروع اثرات با تاخیر باشد، از این رو دوره درمان را تکمیل ننمائید.
- پس از مصرف درب بطری را کامل ببندید.
- دارو را در ظرف اصلی خود نگهداری ننمائید.
- قبل از مصرف بطری را خوب تکان دهید.

■ تداخلات دارویی:

تاکنون تداخلی گزارش نشده است.

■ مصرف در شیردهی و بارداری:

فقط با تجویز پزشک توصیه می گردد.

■ شرایط نگهداری:

دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید. دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



**Niak Berry
Syrup**

قرص نیاک گستریکس (دوی بلغم)

<i>Trachyspermum copticum</i>	Ammi	زنیان
<i>Zataria multiflora</i>	Zataria	آویشن شیرازی
<i>Nigella sativa</i>	Black cumin	سیاه دانه
<i>Pistacia lentiscus</i>	Mastic	مصطکی

مواد جانبی: هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، میکروکریستالین سلولز، سدیم کراس کارملوز، تالک، عسل مصفی، استنارات منیزیم، سیلیکون دی اکساید

■ بسته بندی:
۱۰۰ عدد قرص در بسته بندی قوطی در جعبه بروشوردار. ۵ ورق بلیستر ۱۰ عددی در جعبه بروشور دار.

■ معرفی فرآورده:
ترکیبی است حاوی گیاهانی همچون آویشن، زنیان و سیاه دانه که خاصیت تقویتی معده و ضد نفخ قوی دارند. ضمناً به دلیل وجود تیمول در آویشن و زنیان، این فرآورده ضد سرفه نیز می باشد.

■ این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۱/۵ میلی گرم ترکیبات فنلی بر حسب تیمول در هر قرص استاندارد گردیده است.

■ مکانیسم اثر:
زنیان و آویشن شیرازی حاوی مقادیر قابل توجهی تیمول و کارواکرول هستند که باعث افزایش ترشح موکوس و صفرا و آنزیم های گوارشی می شوند که در نهایت به بهبود فعالیت گوارشی و جلوگیری از ایجاد زخم گوارشی می انجامد. همچنین این مواد موثره خاصیت آنتی باکتریال و ضد قارچ دارند و در مطالعه ای اثر مناسبی علیه هلیکوباکتر پیلوری از خود نشان دادند.
در تحقیقی اثرات آنتی کولینرژیک عصاره زنیان بررسی شد و مشاهده شد که مواد موجود در عصاره می تواند به صورت آنتاگونیست رقابتی بر گیرنده های استیل کولین عمل کند و باعث کاهش اسپاسم روده ای شود. همچنین این گیاه به همراه آویشن در برخی مطالعات خاصیت پرونودیلاتوری و آنتی هیستامینی از خود بروز داده و در مشکلات تنفسی و سرفه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

■ موارد مصرف:
- برطرف کننده نفخ.
- برطرف کننده ورم معده و روده.
- برطرف کننده احساس پری معده.
- برطرف کننده رفلاکس معده.
- در کتب طب سنتی این فرآورده جهت درمان سستی معده و سردی مزاج و ضد استرخا و جهت دفع بلغم استفاده می شود.

■ مقدار و نحوه مصرف:
طبق دستور پزشک و یا:
- جهت مشکلات گوارشی: ۱ تا ۲ قرص بعد از هر وعده غذایی.
- جهت دفع بلغم: ۲ تا ۳ قرص صبح ناشتا و ۲ تا ۳ قرص قبل از خواب همراه یک لیوان آب.

■ عوارض جانبی:
در برخی موارد نادر ممکن است باعث مشکلات گوارشی گردد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:
در صورت وجود حساسیت به هر یک از اجزا از مصرف دارو خودداری شود.

تداخلات دارویی:
مصرف این فرآورده با داروهای ضد انعقاد خون احتیاط مصرف دارد.

■ مصرف در بارداری:
به دلیل وجود گیاهانی همچون زنیان و آویشن شیرازی به دلیل داشتن تیمول فراوان، توصیه نمی شود.

■ مصرف در شیردهی:
طبق نظر پزشک معالج مصرف گردد؛ ممکن است باعث تغییر در طعم شیر شود.

■ شرایط نگهداری:
دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید.
دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



Niak Gastric
tablet
(Balgham)

مواد جانبی: میکروکریستالین سلولز، نشاسته، پوویدون K۳۰، لاکتوز، استئارات منیزیم، شکر، سدیم کراس کارملوز، ژلاتین، کرینات کلسیم، تالک، رنگ آبی، رنگ سان ست یلو.

■ بسته بندی:

۵۰ عدد قرص در بسته بندی قوطی در جعبه بروشوردار.

■ معرفی فرآورده:

قرص سینارول حاوی ۲۰۰ میلی گرم عصاره خشک (۵:۱) برگ های گیاه کنگر فرنگی یا آرتیشو (Artichoke) با نام علمی *Cynara scolymus* از خانواده Compositae می باشد. بر طبق نظر گیاه شناسان این گیاه در طبیعت بطور وحشی یافت نمی شود بلکه بر اثر کشت از گونه کنگر وحشی (*Cynara cardunculus*) اشتقاق یافته است. مصرف گیاه به زمان روم باستان برمی گردد که بعنوان مدر و صفرا بر مورد توجه بود. در طی قرون ۱۶ تا ۱۹ میلادی نیز آرتیشو در درمان روماتیسم، آرتریت، نفرس اورمی، نفرواسکلروز سنگ های کلیوی، سنگ صفرا، اولیگوری و نارسائی کبدی مورد استفاده قرار می گرفت.

■ این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۱ میلی گرم مشتقات هیدروکسی سینامیک اسید بر مبنای کلروژنیک اسید در هر قرص استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:

عصاره آرتیشو حاوی اسید های فنلی از قبیل کافیک اسید، کلروژنیک اسید و سینارین (دی کافوبیل کینیک اسید) می باشد. بر اساس مطالعات انجام شده بر روی موش ها مشخص گردیده که بعد از تزریق داخل صفاقی سینارین، ترشح صفرا افزایش می یابد. این فعالیت نسبت به سدیم دهیدروکولات قویتر و طولانی تر بوده و با افزایش ترشح کلسترول و مواد جامد در صفرا همراه است. همچنین بر خلاف دیگر ترکیبات کلروژنیک بعد از تزریق وریدی سینارین هیچگونه اختلال بعدی در اعمال ترشحاتی کبد مشاهده نمی گردد. تحقیقات متعددی نیز به منظور بررسی اثرات کبدی آرتیشو انجام گرفته است. در یک بررسی *In vitro* ثابت شد که سینارین اثر محافظ بر روی هیاتوسیت داشته و اثرات توكسين ها را مهار می نماید. در بررسی دیگر دیده شد که توان عصاره آرتیشو در مهار سم گالاکتوز آمین از سیلی بین (ماده موثره موجود در گیاه خارمریم) بیشتر است. همچنین کافیک اسید، سینارین و عصاره آرتیشو بصورت *In vivo* عوارض و سمیت تتراکلرید کربن را خنثی می کند. بر اساس آزمایشات انجام گرفته در موش ها مشاهده شده که علاوه بر مهار سنتز کبدی کلسترول، تزریق سینارین موجب مهار افزایش اسیدیته چرب استرئریفیه ناشی از مصرف اتانول شده و میزان چربی ها تا ۲۸٪ کاهش می یابد.

مشاهده شده که عصاره آرتیشو علاوه بر دیوز و افزایش دفع آب و املاح، موجب افزایش اوره و دیگر ترکیبات نیترژن دار در ادرار می گردد. عصاره گیاه حتی اثر آنتی دیورتیک عصاره هیپوفیز خلفی را که حاوی هورمون ADH است مهار و آنتاگونیزه می نماید.

■ موارد مصرف:

- کمک به حفظ سلامت کبد و بهبود نارسایی های کبدی.
- اختلالات گوارشی، ناراحتی صفراوی و دیگر حالاتی که نیاز به افزایش ترشح صفرا باشد.
- کاهش کلسترول خون و کمک به درمان هایپرلیپیدمی.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق دستور پزشک و یا ۳ بار در روز هر بار ۱ تا ۲ قرص قبل از غذا میل گردد.

■ عوارض جانبی:

ممکن است باعث نفخ گردد.



■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- در انسداد مجاری صفراوی و نارسایی شدید کبدی مصرف نگردد.
- در صورت وجود سنگ صفرا تنها زیر نظر پزشک دارو را مصرف ننماید.

■ تداخلات دارویی:

تاکنون تداخل خاصی گزارش نشده است.

■ مصرف در شیردهی و بارداری:

بهرتر است با تجویز پزشک مصرف گردد.

■ شرایط نگهداری:

دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید.
دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.

قرص نیاک

سینارول



Niak Cynarol
tablet

قرص آلوئه پلاس

<i>Aloe vera</i>	Aloe	صبر زرد
<i>Terminalia chebula</i>	<i>Mirobalanus citrina</i>	هلیله زرد
<i>Ipomoea turpethum</i>	Turpeth	ترید
<i>Pistacia lentiscus</i>	Mastic	مصطکی
<i>Rosa damascena</i>	Red rose	گل سرخ

بسته بندی:

۳۰ عدد قرص در بسته بندی قوطی در جعبه برشودار.

معرفی فرآورده:

حب صبر رازی یک فرآورده سنتی بوده و بر اساس وجود حداقل ۱۰ میلی گرم مشتقات هیدروکسی آنتراسن بر حسب باربالوئین در هر قرص استاندارد شده است.

مکانیسم اثر:

آلوئه ورا حاوی مواد موثره گوناگونی از جمله ترکیبات آنتراکینون مانند آلوئین A و B، ترکیبات قندی مانند گلوکومانان ها، هورمون های رشد گیاهی مانند ژبیرلین و غیره است.

گلوکومانان و ژبیرلین در تحریک ساخت کلاژن نقش دارند و باعث تسریع بهبود زخم می شوند.

مشتقات گلوکومانان باعث افزایش سلول های CD ۴+ و سنتز و رهایش IL-۱ و TNF از ماکروفاژها می شوند که در افزایش قدرت سیستم ایمنی موثرند. آلوئین باعث ترشح موکوس و افزایش حرکات روده می شود. این ترکیب همچنین قادر به غیر فعال کردن برخی ویروس ها نیز می باشد. آلوئه ورا با مهار مسیر سیکلواکسیژناز و کاهش تولید پروستاگلندین ها باعث بروز خاصیت ضد التهابی نیز می شود. همچنین طبق منابع طب سنتی از آن به عنوان برطرف کننده درد سر، درد معده، اوجاع مفاصل (درد های مفاصل)، لقوه (بیماری کجی دهان و صورت) نام برده شده است.



موارد مصرف:

مفید جهت سردرد و درد مفاصل.

مقدار و نحوه مصرف:

طبق دستور پزشک و یا قبل از خواب، ۲ تا ۳ قرص همراه با یک لیوان آب ولرم میل شود.

عوارض جانبی:

ممکن است باعث ایجاد نفخ و دل پیچه شود. مصرف طولانی مدت دارو ممکن است باعث اختلال در تعادل آب و املاح بدن بویژه پتاسیم شود، همچنین باعث ایجاد آلومینوری و همپوری می شود. کاهش مقدار پتاسیم در بدن احتمال نقص عملکرد قلب را بالا می برد و همچنین ممکن است باعث کاهش قدرت ماهیچه ای شود، بویژه در مواردی که بیمار از داروهای مدر و گلیکوزیدهای قلبی استفاده می کند.

موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- افراد دچار انسداد روده، بیماری های حاد التهابی روده، مانند بیماری کرون، کولیت اولسراتیو، آپاندیس و دردهای شکمی با منشأ نا مشخص.
- تجویز این دارو برای افراد با سنین کمتر از ۱۲ سال توصیه نمی شود.
- قرص صبر زرد و سایر ملین ها به دلیل تحریک روده نباید به صورت خودسرانه برای مدت طولانی استفاده شوند.
- توصیه می شود برای اثر بخشی بهتر فرآورده بعد از دو هفته استفاده، قرص سینارول به رژیم درمانی اضافه گردد.
- مصرف دارو بدون تجویز پزشک ممنوع است.
- در صورت وجود حساسیت به هر یک از اجزا از مصرف دارو خودداری نمایید.

تداخلات دارویی:

به علت کاهش سطح پتاسیم در برخی از داروها مانند دیگوسکین، مدرها و وارفارین باید با احتیاط مصرف شود.

مصرف در بارداری:

به دلیل وجود ترکیبات آنتراکینونی مصرف دارو در دوران بارداری می تواند موجب سقط جنین گردد لذا در این دوره مصرف دارو ممنوع می باشد.

مصرف در شیردهی:

می تواند موجب تغییر در طعم شیر و ایجاد دلپیچه و نفخ در نوزاد گردد.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰ °C) و دور از نور نگهداری کنید. دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



Aloe plus
tablet

قرص کوری تریپ

<i>Terminalia chebula</i>	<i>Mirobalanus citrina</i>	هلیله زرد
<i>Terminalia chebula</i>	<i>Mirobalanus nigrae</i>	هلیله سیاه
<i>Terminalia chebula</i>	<i>Mirobalanus chebula</i>	هلیله کابلی
<i>Terminalia bellirica</i>	<i>Belleric myrobalan</i>	بلیله
<i>Phyllanthus emblica</i>	<i>Emblic myrobalan</i>	آمله
<i>Coriandrum sativum</i>	<i>Coriander</i>	گشنیز

مواد جانبی: روغن بادام شیرین، عسل

■ بسته بندی:

۱۰۰ عدد قرص در بسته بندی قوطی در جعبه پرشوردار.

■ معرفی فرآورده:

اٹریفل معرب کلمه تری پهلای (Triphala) هندی بوده که به ترکیبات حاوی هلیله، بلیله و آمله گفته می‌شده است. کوری تریپ یا اٹریفل گشنیزی علاوه بر اجزای یاد شده حاوی گشنیز بوده که ترکیباتی باد شکن، مقوی معده و ضد نفخ می‌باشند. در طب سنتی در مواردی همچون دفع بخارات از دماغ و ریختن سودای سوخته به معده و تقویت حواس، نافع در مورد ثقل صامعه صغراوی کاربرد دارد. این اٹریفل جهت برطرف نمودن سردرد ناشی از مشارکت طحال نیز بکار می‌رود.

■ - این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۳ درصد ترکیبات فنلی بر حسب گالیک اسید استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:

هلیله حاوی تانن، اسیدهای میوه و اسیدهای چرب است و در کاهش کلسترول موثر است. همچنین این گیاه دارای ماده موثره ای به نام چپولائیک اسید است که با مهار مالتاز و آلفا-گلوکوزیداز باعث مهار جذب قندها و کمک به درمان دیابت می‌شود. بلیله نیز دارای تانن و ترکیبات فنلی است و اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریال از خود نشان می‌دهد. آمله حاوی آسکوربیک اسید (ویتامین ث) و ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی است و توان آنتی اکسیدانی بالایی دارد و طبق برخی مطالعات می‌تواند به تشکیل موکوس در دستگاه گوارش کمک کرده و باعث بهبود زخم های گوارشی شود. روغن فرار گشنیز از ترکیباتی مانند کوریاندرول تشکیل شده و باعث تحریک ترشح مایعات گوارشی و اشتها می‌شود و همچنین ضد نفخ و اسپاسم است.

■ موارد مصرف:

- ضد نفخ و ضد رفلاکس و ضد ورم معده.
- تونیک و مقوی معده و درمان کننده سوء هاضمه.
- موثر در درمان روده تحریک پذیر (IBS).

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق نظر پزشک و یا روزانه ۴ تا ۸ قرص هنگام خواب با آب گرم میل شود.

■ عوارض جانبی:

به دلیل وجود مصلحات عارضه ای ذکر نشده است.

■ تداخلات دارویی:

با فاصله حداقل ۲ ساعت با فرآورده های حاوی آهن مصرف شود.



■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- دوره درمان حداقل ۱ الی ۲ ماه می‌باشد، لذا مصرف دارو را تا پایان دوره درمان بطور منظم مصرف ننمائید.
- در صورت فراموش نمودن یک دوز، دوز بعدی را در زمان خود مصرف نموده و از افزایش دوز بعدی اجتناب ننمائید.
- بیش‌تر از ۳ ماه به طور متوالی مصرف نشود.
- در افراد مبتلا به بیماری های کبدی و تب با احتیاط مصرف گردد. مصرف زیاد آن باعث زرد شدن رنگ می‌شود.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:

به دلیل عدم مطالعات کافی در این زمینه منع مصرف دارد.

■ شرایط نگهداری:

دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰ °C) و دور از نور نگهداری کنید.
دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



**Coritrip
tablet**

کپسول گوگاتریپ

<i>Terminalia chebula</i>	Mirobalanus citrina	هلیله زرد
<i>Terminalia chebula</i>	Mirobalanus chebula	هلیله کابلی
<i>Terminalia chebula</i>	Mirobalanus nigrae	هلیله سیاه
<i>Terminalia Bellirica</i>	Belleric myrobalan	بلیله
<i>Phyllanthus emblica</i>	Emblic myrobalan	آمله
<i>Commiphora wightii</i>	Gum guggul	مقل
<i>Lavandula stoechas</i>	Lavender	اسطوخودوس
<i>Cuscuta epithymum</i>	Dodder	افتیمون
<i>Allium porrum</i>	Leek	تره (گندنا)
<i>Cassia fistula</i>	Golden shower tree fruit	خیار چنبر (فلوس)

مواد جانبی: روغن بادام شیرین، عسل مصفی.

■ بسته بندی:

۱۰۰ عدد کپسول در بسته بندی قوطی در جعبه بروشوردار.

■ معرفی فرآورده:

اٹریفل معرب کلمه تری پهلای (Triphala) هندی بوده که به ترکیبات حاوی هلیله، بلیله و آمله گفته می شده است. گوگاتریپ یا اٹریفل مقل ملین علاوه بر گیاهان مذکور حاوی مقل، افتیمون، فلوس بوده که همگی ملین می باشند. در طب سنتی این محصول به عنوان ملین، ضد نفخ، موثر در درمان بواسیر (هموروئید)، شقاق و همچنین جهت درمان سردی و رطوبت و دفع بلغم استفاده می گردد. مطابق کتب طب سنتی این فرآورده طبع را نرم کرده و بواسیر را نافع است.

■ - این فرآورده بر اساس حداقل ۲ درصد ترکیبات فنلی بر حسب گالیک اسید استاندارد شده است.



■ موارد مصرف :

- ملین و بادشکن
- داروی کمکی در درمان بواسیر و شقاق
- داروی کمکی جهت درمان روده تحریک پذیر

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق دستور پزشک و یا ۳ بار در روز و هر بار ۱ تا ۲ کپسول میل شود.

■ عوارض جانبی:

- ممکن است سبب لینت مزاج و مشکلات گوارشی گردد.
- ممکن است باعث اسهال و نفخ و در برخی موارد باعث کھیر و خارش شود.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- در صورت وجود حساسیت به هر یک از اجزای فرآورده از مصرف آن خودداری کنید.
- به سبب وجود هلیله در دارو، مصرف آن در سرفه حاد، اسهال حاد و مرحله ابتدایی دیاستری (التهاب روده به همراه اسهال خونی) ممنوع است.
- موجب تشدید اثر دیگر ملین ها می گردد لذا از مصرف همزمان آن بدون دستور پزشک اجتناب کنید.
- در صورت مصرف همزمان با داروهای ملین و مسهل، دوز داروها کاهش یابد.
- دوره درمان حداقل ۱ الی ۲ ماه می باشد، لذا مصرف دارو را تا پایان دوره درمان بطور منظم مصرف نمایید.
- در صورت فراموش نمودن یک دوز، دوز بعدی را در زمان خود مصرف نموده و از افزایش دوز بعدی اجتناب ننمائید.
- تجویز این فرآورده در افراد دچار نارسایی کبدی و کلیوی و افرادی که فرآورده های حاوی هورمون های تیروئیدی، داروهای ضد انعقاد خون و ضد بارداری هورمونی خوراکی مصرف می کنند، تحت نظر پزشک صورت گیرد.

■ تداخلات دارویی:

موجب تشدید اثر دیگر ملین ها می گردد. از مصرف همزمان آن بدون نظر پزشک اجتناب گردد.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف نکرد، مگر با تجویز پزشک.

■ شرایط نگهداری:

دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید. دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



Gugatrip
capsule

قرص

سیمپل تریپ

<i>Terminalia chebula</i>	Mirobalanus citrina	هلیله زرد
<i>Terminalia chebula</i>	Mirobalanus nigrae	هلیله سیاه
<i>Terminalia chebula</i>	Mirobalanus chebula	هلیله کابلی
<i>Terminalia belerica</i>	Beleric myrobalan	بليله
<i>Phyllanthus emblica</i>	Embellic myrobalan	آمله

مواد جانبی: عسل، روغن بادام شیرین، منیزیم استئارات، سیلیکون دی اکساید، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز

■ بسته بندی:
۱۰۰ عدد قرص در بسته بندی قوطی در جعبه بروشوردار.

■ معرفی فرآورده:
اظر بفعل معرب کلمه تری پهلای (Triphala) هندی بوده که به ترکیبات حاوی هلیله، بليله و آمله گفته می‌شده است. در طب سنتی جهت ضعف معده، بواسیر، تقویت مغز استفاده شده و گفته می‌شود مانع از سفید شدن موی سر و عامل نیکو کردن رنگ رخساره و موجب دفع رطوبات به ویژه بلغم شده و به هضم غذا کمک می‌کند.

■ این فرآورده براساس حداقل ۴٪ ترکیبات فنولی تام برحسب گالیک اسید استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:
هلیله حاوی ترکیبات تاننی فراوان مانند چپولازیک اسید و چپولنیک اسید، پلی‌فنول‌ها و اسیدهای میوه و اسیدهای چرب است و اثرات آنتی اکسیدانی مناسبی از خود بروز می‌دهد. بليله نیز دارای تانن و ترکیبات فنولی است و اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریال از خود نشان می‌دهد. آمله حاوی آسکوربیک اسید (ویتامین ث) و ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی است و توان آنتی اکسیدانی بالایی دارد و طبق برخی مطالعات می‌تواند به تشکیل موکوس در دستگاه گوارش کمک کرده و باعث بهبود زخم های گوارشی شود. توان آنتی اکسیدانی بالای این دارو که بیشتر مرتبط با ترکیبات تاننی و فنولی می‌باشد باعث می‌شود آمینواسیدها و آنزیم های دخیل در فرایندهای رشد مو و تولید رنگدانه کمتر مورد آسیب قرار بگیرند به خصوص آسیب ناشی از رادیکال های آزاد و گونه های فعال اکسیژن. در مطالعه‌ای مشخص شد مصرف فرآورده‌های حاوی ترکیبات تاننی باعث جذب بیشتر متیونین و افزایش کاربرد سیستم در واکنش‌های بیوسنتز بدن می‌شوند و این دو آمینواسید در فرایندهای مرتبط با بهبود وضعیت پوست و مو در بدن دخیل هستند.

روغن بادام شیرین حاوی اسیدهای چرب مانند اولئیک اسید و لینولئیک اسید می‌باشد و اثرات ملین و پوشانندگی دارد.



موارد مصرف:
- مقوی معده و ضد نفخ
- کمک در درمان التهاب روده و روده تحریک پذیر (IBS).
- مانع از سفید شدن موی سر
- کمک به شادابی پوست

■ مقدار و نحوه مصرف:
طبق دستور پزشک و یا هر ۸ ساعت ۲ عدد قرص مصرف گردد. (بیشینه مصرف ۱۰ عدد قرص می‌باشد)

■ عوارض جانبی:
نفخ و کرامپ شکمی و لینت خفیف که در صورت بروز معمولاً در ادامه درمان کاهش یافته یا برطرف می‌گردد.

■ تداخلات دارویی:
موجب تشدید اثر داروهای ملین و مسهل می‌گردد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:
- در صورت وجود حساسیت شناخته شده به هریک از اجزای فرآورده از مصرف آن خودداری فرمائید.
- در صورت مصرف همزمان با داروهای ملین، دوز داروها کاهش یابد.
- دوره درمان حداقل ۴-۸ هفته می‌باشد، لذا مصرف دارو را تا پایان دوره درمان بطور منظم مصرف نمائید.
- در صورت فراموش نمودن یک دوز، دوز بعدی را در زمان خود مصرف نموده و از افزایش دوز بعدی اجتناب نمائید.

■ مصرف در بارداری:
طبق نظر پزشک معالج مصرف گردد.

■ مصرف در شیردهی:
ممکن است موجب تغییر در طعم شیر گردد. در مواردی ممکن است موجب لینت مزاج شیرخوار گردد.

■ شرایط نگهداری:
دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید.
دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.



Simple trip
tablet

کپسول

زنیان پلاس نیاک

<i>Trachyspermum copticum</i>	Ammi	زنیان
<i>Zataria multiflora</i>	Zataria	آویشن شیرازی
<i>Nigella sativa</i>	Black cumin	سیاه دانه
<i>Pistacia lentiscus</i>	Mastic	مصطکی

مواد جانبی: عسل مصفی.

■ بسته بندی:

۱۰۰ عدد کپسول در بسته بندی قوطی همراه با جعبه بروشوردار.

■ معرفی فرآورده:

ترکیبی است حاوی گیاهانی همچون آویشن، زنیان و سیاه دانه که خاصیت تقویتی معده و ضد نفخ قوی دارند. ضمناً به دلیل وجود تیمول در آویشن و زنیان، این فرآورده می تواند ضد سرفه نیز باشد. استاندارد شده بر اساس حداقل ۲/۵ میلی گرم ترکیبات فنی تام بر حسب تیمول در هر کپسول.

■ مکانیسم اثر:

زنیان و آویشن شیرازی حاوی مقادیر قابل توجهی تیمول و کاراکرول هستند که باعث افزایش ترشح موکوس و صفرا و آنزیم های گوارشی می شوند که در نهایت به بهبود فعالیت گوارشی و جلوگیری از ایجاد زخم گوارشی می انجامد. همچنین این مواد موثره خاصیت آنتی باکتریال و ضد قارچ دارند و در مطالعه ای اثر مناسبی علیه هلیکوباکتر پیلوری از خود نشان دادند.

در تحقیقی اثرات آنتی کولینرژیک عصاره زنیان بررسی شد و مشاهده شد که مواد موجود در عصاره می تواند به صورت آنتاگونیست رقابتی بر گیرنده های استیل کولین عمل کند و باعث کاهش اسپاسم روده ای شود. همچنین این گیاه به همراه آویشن در برخی مطالعات خاصیت برونکودیلاتوری و آنتی هیستامینی از خود بروز داده و در مشکلات تنفسی و سرفه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.



■ موارد مصرف:

- برطرف کننده نفخ.
- برطرف کننده ورم معده و روده.
- برطرف کننده احساس پری معده.
- برطرف کننده رفلاکس معده.
- در کتب طب سنتی این فرآورده جهت درمان سستی معده و سردی مزاج و ضد استرخا و جهت دفع بلغم استفاده می شود.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق دستور پزشک و یا ۱ عدد کپسول صبح ناشتا و یک کپسول شب هنگام خواب مصرف گردد.

■ عوارض جانبی:

در برخی موارد نادر ممکن است باعث مشکلات گوارشی گردد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه :

در صورت وجود حساسیت به هر یک از اجزا از مصرف دارو خودداری شود.

■ تداخلات دارویی:

مصرف این فرآورده با داروهای ضد انعقاد خون احتیاط مصرف دارد .

■ مصرف در بارداری:

به دلیل وجود گیاهانی همچون زنیان و آویشن شیرازی و داشتن تیمول فراوان، توصیه نمی شود.

■ مصرف در شیردهی:

طبق نظر پزشک معالج مصرف گردد؛ ممکن است باعث تغییر در طعم شیر گردد.

■ شرایط نگهداری:

دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید. دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.



Zenian Plus Niac
Capsule

پودر

ماءالجبن

Cow's milk	شیر تازه گاو
Vitis vinifera	سرکه انگور

مواد جانبی: شکر.

■ بسته بندی:

۱۰ عدد ساشه ۳۰ گرمی در جعبه پرشوردار.

■ معرفی فرآورده :

پودر ماءالجبن از فرآورده های طب سنتی ایران می باشد که توسط بخش تحقیقات و توسعه داروسازی نیاک به صورت امروزی فرموله شده و در بسته بندی ساشه که استفاده آن آسان می باشد، قرار گرفته است.

■ - این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۵ درصد پروتئین استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:

این فرآورده تقریباً حاوی تمام آمینو اسید های ضروری می باشد و جذب سریع دارد. به دلیل اثرات بالای آنتی اکسیدانی می تواند از کبد محافظت کند.



■ موارد مصرف:

- ضد سوداء و پاک کننده اخلاط فاسد خون و کبد.
- رفع خارش پوست و افزایش رطوبت بدن و مسهل.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق دستور پزشک و یا روزانه یک ساشه در یک لیوان آب ولرم حل شود و میل گردد.

■ عوارض جانبی:

احتمال بروز اسهال و استفراغ که طبیعی بوده و بتدریج کاهش می یابد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- در بیماران مبتلا به اسهال، کولیت و التهاب های روده منع مصرف دارد.
- در بیمارانی که نسبت به لاکتوز حساسیت دارند احتیاط مصرف دارد.
- طبق منابع طب سنتی، مدت مصرف ماءالجبن به صورت عمومی چهل روز می باشد که می توان این دوره را طبق صلاحدید پزشک ادامه داد.

■ مصرف در شیردهی و بارداری:

مجاز می باشد.

■ شرایط نگهداری :

در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری شود.
دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



پودر ماءالجبن

(فرآورده طب سنتی ایران)

WHEY POWDER

(محتویات بسته بندی)

Whey
Powder



شربت زیب



کپسول گین استاپ



پودر ماءالجین



پودر آلمونات



برگشت به فهرست اصلی

شربت زیب

<i>Vitis vinifera</i>	Raisin	مویز
<i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Cinnamon bark	دارچین
<i>Zingiber officinale</i>	Ginger	زنجبیل
<i>Eugenia caryophyllata</i>	Clove	میخک
<i>Crocus sativus</i>	Saffron	زعفران
<i>Nardos tachys jatamansi</i>	Muskroot	سنبل الطیب
<i>Valeriana celtica</i>	Valerian	سنبل رومی
<i>Pistacia lentiscus</i>	Mastic	مصطکی
<i>Cichorium intybus</i>	Chicory	کاسنی
	Purified honey	عسل مصفی

■ بسته بندی:
شربت در بطری های ۱۲۰ میلی لیتری درجه بندی بر روشوردار.

■ معرفی فرآورده:
فرآورده ای است سرشار از موادی با طبع گرم و مغذی که موجب تقویت عمومی بدن و حفظ صحت شده و در ضعف ها و خستگی های مفرط در زمان سالخوردگی و دوره نقاهت بیماریها بسیار مفید می باشد. از دیدگاه طب سنتی تنها نوشیدنی است که مصرف آن همراه با غذا مجاز دانسته شده و توصیه می گردد.

■ این فرآورده بر اساس حداقل ۳۰ درصد قندهای احیایی بر حسب مالتوز استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:
مویز حاوی پروآنتوسیانیدین ها، فلاونوئیدها، رسوراترول و اسیدهای میوه است و اثرات آنتی اکسیدان و ضد تصلب شرایین با همان گرفتگی عروق را از خود بروز می دهد.
میخک دارای مواد موثره ای مانده اوژنول و اوژنیل استات است که باعث بروز اثرات اسپاسمولیتیک، بهبود زخم معده، افزایش تولید موکوس و کاهش ترشح اسید پپسین می شود.
زعفران حاوی مواد موثره کروسین، سافرانال و کاروتن ها است و در مطالعات در مقایسه با داروهای معمول ضد افسردگی مانند ایمی پرامین و فلوکستین خاصیت ضد افسردگی مناسبی از خود نشان داده است بدون آنکه عوارضی مانند عوارض این داروها را از خود بروز دهد.
زنجبیل دارای ماده موثره جینجیرول است و باعث افزایش اشتها و تحریک سیستم ایمنی می گردد.
دارچین حاوی سینامالدهید، اوژنول و سینامیک اسید است و می تواند باعث افزایش اشتها و رفع مشکلات گوارشی گردد.



موارد مصرف:
- افزایش قوای بدن و برطرف کننده ضعف عمومی بدن.
- دردهای سرد مزمن و التهاب مزمن مفاصل مانند نقرس و آرتروز.
- برطرف کننده ناتوانی جنسی و افزایش دهنده میل جنسی در مردان و زنان.
- درمان کننده سرد مزاجی و موثر در درمان بغم و رطوبات.
- حفظ صحت

■ مقدار و نحوه مصرف:
طبق دستور پزشک و یا ۳ قاشق غذاخوری از شربت را در یک لیوان آب ولرم رقیق نموده و سپس بعد از هر وعده غذا بنوشید.

■ عوارض جانبی:
در برخی افراد ممکن است باعث ناراحتی گوارشی گردد.

■ تداخلات دارویی:
ذکر نشده است.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:
مصرف در افراد دیابتی به دلیل وجود ترکیبات قندی (شیره مویز و عسل) توصیه نمی شود، مگر با نظر پزشک.
در صورت وجود هرگونه حساسیت به هر یک از اجزاء دارو از مصرف خودداری گردد.
در افراد گرم مزاج و در فصول گرم، میزان مصرف به نصف تا یک سوم کاهش یابد.
به دلیل وجود ترکیبات گیاهی ایجاد رسوب در شریت عادی می باشد.
قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:
توصیه نمی گردد مگر تحت نظر پزشک و با احتیاط کامل.

■ شرایط نگهداری:
دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نورنگهداری کنید.
دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



**Zabib
syrup**

کیسول گین استاپ

<i>Trachyspermum copticum</i> L.	Ammi	زنیان
<i>Foeniculum vulgare</i>	Fennel	رازیانه
<i>Carum carvi</i>	Caraway	زیره کرمانی
<i>Ruta graveolens</i>	Common rue	سداب
<i>Origanum vulgare</i>	Oregano	مرزنجوش
	Purified shellac	لاک مغسول
	Natron	بوره ارمنی

■ بسته بندی:
۱۰۰ عدد کیسول در بسته‌بندی قوطی در جعبه برشودارد.

■ معرفی فرآورده:
این فرآورده حاوی گیاهانی است از جمله زنیان، زیره، رازیانه و چندین ترکیب دیگر که همگی تاثیر فراوانی در افزایش سرعت هضم و تخلیه معده دارند. همچنین لاک دارای خاصیت قابض بوده و باعث کاهش اشتها می‌شود. از این رو، این فرآورده تاثیر بسزایی در کاهش وزن اضافه بدن دارد.

■ این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۵/۵ درصد ترکیبات فنلی برحسب گالیک اسید در هر کیسول استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:
گیاهان استفاده شده در این فرآورده با بدن سازگار می‌باشند که با چندین مکانیسم باعث کاهش وزن اضافه در فرد می‌شوند. این مکانیسم‌ها شامل:
- کاهش اشتها و میل به پرخوری.
- هضم زودتر غذا و تخلیه سریعتر معده، که این عمل باعث افزایش سرعت عبور مواد غذایی چرب از محل جذب شده می‌شود، از این رو از جذب اضافه چربی ممانعت به عمل می‌آید.
- دفع سریع و راحت مواد غذایی هضم شده از روده، که این عمل باعث کاهش بازجذب چربی و مواد غذایی هضم شده در روده می‌شود.



■ موارد مصرف:
- برطرف کننده چاقی و ایجاد لاغری.
- کاهش اشتها و میل به پرخوری.
- هضم و دفع سریع مواد غذایی.

■ مقدار و نحوه مصرف:
طبق دستور پزشک و یا ۳ بار در روز هر بار ۲ تا ۳ کیسول را نیم ساعت قبل از غذا با یک لیوان عرق زیره میل نمایید.

■ عوارض جانبی:
ممکن است به دلیل وجود برخی ترکیبات، کمی باعث لینت و پیچش شکم شود که در ابتدای دوره مصرف طبیعی می‌باشد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:
- برای کاهش عوارض گوارشی می‌توان همراه با مصرف این دارو از عرق زیره استفاده نمود.
- در افرادی که صدام مشارکت معدی دارند، افرادی که سابقه زخم معده و اثنی عشر داشته باشند و در افرادی که دچار بیماری‌های صفراوی و کبدی هستند منع مصرف دارد.
- برای گرم مزاجان مضر است و موجب آزار معده گرم می‌شود.
- مصرف بیش از ۳ ماه ممکن است با عارضه کبدی همراه باشد.
- در افرادی که دچار کم خونی (تالاسمی) و یا هموگلوبین پایین هستند منع مصرف دارد.
- در صورت وجود حساسیت شناخته شده به هریک از اجزاء فرآورده از مصرف آن بپرهیزید.

■ تداخلات دارویی:
تاکنون تداخلی گزارش نشده است.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:
به دلیل عدم مطالعات کافی مصرف نگردد یا با تجویز پزشک مصرف گردد.

■ شرایط نگهداری:
دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.
دارو را دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید.



**Gain stop
capsule**

پودر

ماءالجبن

Cow's milk	شیر تازه گاو
Vitis vinifera	سرکه انگور

مواد جانبی: شکر.

■ بسته بندی:

۱۰ عدد ساشه ۳۰ گرمی در جعبه پرشوردار.

■ معرفی فرآورده :

پودر ماءالجبن از فرآورده های طب سنتی ایران می باشد که توسط بخش تحقیقات و توسعه داروسازی نیاک به صورت امروزی فرموله شده و در بسته بندی ساشه که استفاده آن آسان می باشد، قرار گرفته است.

■ - این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۵ درصد پروتئین استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:

این فرآورده تقریباً حاوی تمام آمینو اسید های ضروری می باشد و جذب سریع دارد. به دلیل اثرات بالای آنتی اکسیدانی می تواند از کبد محافظت کند.



■ موارد مصرف:

- ضد سوداء و پاک کننده اخلاط فاسد خون و کبد.
- رفع خارش پوست و افزایش رطوبت بدن و مسهل.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق دستور پزشک و یا روزانه یک ساشه در یک لیوان آب ولرم حل شود و میل گردد.

■ عوارض جانبی:

احتمال بروز اسهال و استفراغ که طبیعی بوده و بتدریج کاهش می یابد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- در بیماران مبتلا به اسهال، کولیت و التهاب های روده منع مصرف دارد.
- در بیمارانی که نسبت به لاکتوز حساسیت دارند احتیاط مصرف دارد.
- طبق منابع طب سنتی، مدت مصرف ماءالجبن به صورت عمومی چهل روز می باشد که می توان این دوره را طبق صلاحدید پزشک ادامه داد.

■ مصرف در شیردهی و بارداری:

مجاز می باشد.

■ شرایط نگهداری :

در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری شود.
دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



پودر ماءالجبن

(فرآورده طب سنتی ایران)

WHEY POWDER

تولید و بسته بندی در ایران

Whey
Powder

پودر

آلمونات

<i>Amygdalus communis</i>	Almond	بادام درختی
<i>Cocos nucifera</i>	Coconut powder	پودر نارگیل
<i>Astragalus tragacantha</i>	Tragacanth	کتیرا
	Starch	نشاسته

مواد جانبی: شکر.

■ بسته بندی:

۲۰ عدد ساشه ۱۰ گرمی در جعبه مقوایی برشوردار.

■ - این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۷ درصد پروتئین استاندارد شده است.



موارد مصرف:

چاق کننده ، تقویت کننده نیروی جنسی

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق دستور پزشک یا به مدت ۲ ماه ، روزی ۳ مرتبه ، هر بار یک ساشه را در یک لیوان شیر گرم حل نموده، میل گردد.

■ عوارض جانبی:

ذکر نشده است.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- در بیماران دیابتی به دلیل وجود شکر و نشاسته با تجویز پزشک مصرف گردد.
- جهت اثربخشی دارو ، دوره درمان را کامل نمایید و به طور منظم دارو را مصرف کنید.

■ مصرف در شیردهی و بارداری:

بهتر است با تجویز پزشک متخصص مصرف گردد.

■ شرایط نگهداری:

دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید.
دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



Almonut
Powder



قرص رازی



قرص نیاک ایارج فیکرا



قرص دودرتیرپ



پماد کاپو درم



برگشت به فهرست اصلی

قرص رازی

<i>Terminalia chebula</i>	<i>Mirobalanus citrina</i>	هلیله زرد
<i>Aloe vera</i>	<i>Aloe</i>	صبر زرد
<i>Colchicum autumnale L</i>	<i>Autumn crocus</i>	سونرجان

مواد جانی: پوویدون، میکروکریستالین سلولز، کراس کارملوز سدیم، سیلیکون دی اکساید، استئارات منیزیم، تالک.

■ بسته بندی: ۱۰۰ عدد قرص در بسته بندی قوطی در جعبه بروشوردار.

■ معرفی فرآورده: ترکیبی است حاوی ۱۰۰ میلی گرم سونرجان (غنی از کلشی سین، ماده ای ضد التهاب) در هر قرص، که در درمان و پیشگیری از نفرس، دردهای مفاصل و سایر التهابات استخوانی مصرف می گردد. همچنین وجود اجزای دیگر مانند صبر زرد (آلوئه) که صفرابر و مسکن می باشد در افزایش کارایی دارو و کاهش عوارض سونرجان مفید است.

■ این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۰/۰۳ میلی گرم کلشی سین در هر قرص استاندارد گردیده است.

■ مکانیسم اثر: سونرجان حاوی آلکالوئیدی به نام کلشی سین است که می تواند از مهاجرت فاگوسیت ها در التهابات جلوگیری کند و همچنین مانع تجمع کریستال های اورات در مفاصل می شود. صبر زرد نیز در تحقیقات نشان داده که قادر به مهار مسیر التهابی سیکلواکسیژناز و جلوگیری از تشکیل فاکتورهای التهابی مانند ترومبوسکان است.

■ موارد مصرف: موثر در درمان دردهای مفاصل و آرتروز، کمردرد، دردهای سیاتیک و نفرس، کاهش التهاب دیسک کمر، مفید در بیماری خود ایمنی مانند بهجت، برص و... در کتب طب سنتی به عنوان مسهل اخلاط از مفاصل، عرق النساء، نفرس و درد لگن از دارو یاد شده است.

■ مقدار و نحوه مصرف: - در حملات حاد نفرس، کمر درد یا درد مفاصل: ابتدا با ۳ قرص درمان را شروع کرده و سپس هر ۴-۵ ساعت ۳ قرص مصرف شود، دوز مصرفی را در صورت لزوم به تدریج تا ۶ قرص در هر وعده افزایش داده تا درد تسکین یابد. در صورت بروز اسهال به تدریج دارو را کاهش دهید تا لینت ملایم باقی بماند و با نظر پزشک بین ۶ تا ۱۲ قرص در روز دوز مصرفی را ثابت نگه دارید. دوره درمان طبق نظر پزشک بین ۳ تا ۶ ماه می باشد. حداکثر دوز مجاز مصرفی ۲۴ قرص در روز است. - در درمان دردهای ملایم و پیشگیری از حملات: روزی ۳ بار هر بار ۱ تا ۲ قرص یا طبق دستور پزشک. - درمان بیماری های خود ایمنی و بهجت: روزی ۳ بار هر بار ۲ قرص یا طبق دستور پزشک. - درمان سیروز کبدی: روزی ۲ قرص، ۵ روز در هفته یا طبق دستور پزشک. - درمان سیروز صفراوی اولیه: روزی ۲ بار هر بار ۱ قرص یا طبق دستور پزشک.

■ عوارض جانی: اعصاب مرکزی (به ندرت): توریت محیطی. دستگاه گوارش: استفراغ، اسهال، درد شکمی، تهوع. اداری: تناسلی: آرواسپرمی برگشت پذیر. خون: کاهش فعالیت مغز استخوان همراه با کم خونی آپلاستیک، آگرانولوسیتوز، ترومبوسیتوپنی، پورپورای ترومبوسیتوپنیک. پوست: آلوسپی، درمانیت، کهیر. عضلانی- اسکلتی: میوپاتی. سایر عوارض: حساسیت مغز.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه: - در اختلالات شدید قلبی، کلیوی، بیماری دیسکرازی خونی، افراد دارای عضو پیوندی یا حساسیت مغز به اجزاء فرآورده مصرف نگردد. - در صورت بروز یثورات پوستی، گلودرد، تب، خونریزی یا بهبودی غیرعادی، خستگی، ضعف، بی حسی یا احساس سوزش به پزشک مراجعه کنید. - در صورت بروز تهوع، استفراغ، درد معده یا تداوم اسهال شدید، مصرف دارو را قطع کنید. - از مصرف فرآورده های حاوی الکل در طول درمان یا دارو به شدت اجتناب گردد؛ زیرا الکل اثر دارو را مهار می نماید.

■ تداخلات دارویی: کلشی سین سبب سوء جذب برگشت پذیر ویتامین B12، افزایش حساسیت نسبت به داروهای مضعف CNS و افزایش پاسخ به داروهای مقلد سمپاتیک می شود. اثر کلشی سین به وسیله داروهای آنتی اسید و الکل مهار می شود. کلاریترومایسین، اریترومایسین، باعث افزایش سطح کلشی سین شده و سمیت آن را افزایش می دهند. دیورتیک های لوپ ممکن است باعث کاهش اثر پیشگیری کننده کلشی سین شوند، این دارو ها نباید با هم مصرف شوند. داروهای قلبیایی کننده اثر کلشی سین را افزایش می دهند.

■ مصرف در بارداری: ممنوع (رده C).

■ مصرف در شیردهی: بی ضرری مصرف کلشی سین در دوران شیردهی ثابت نشده است و میزان ترشح این دارو در شیر مادر مشخص نمی باشد و با تجویز پزشک مصرف گردد.

■ شرایط نگهداری: دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید. دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید.



**Razi
Tablet**

<i>Aloe perryi</i>	Aloe	صبر زرد
<i>Crocus sativus</i>	Saffron	زعفران
<i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Cinnamon	دارچین
<i>Cinnamomum iners</i>	Chinese cinnamon	سلیخه
<i>Pistacia lentiscus</i>	Mastic	مصطکی
<i>Commiphora opobalsamum</i>	Balsam of mecca	چوب بلسان
<i>Commiphora opobalsamum</i>	Balsam of mecca	حب(دانه) بلسان
<i>Asarum europaeum</i>	Indian valerian	اسارون
<i>Nardostachys jatamansi</i>	Muskroot	سنبل الطیب

مواد جانبی: سیلیکون دی اکساید، تالک، منیزیم استئارات، نشاسته دارویی

قرص نیاک ایاراج فیقرا

■ بسته بندی:

۳۰ عدد قرص در بسته بندی قوطی در جعبه برشودار.

■ مکانیسم اثر:

صبر زرد نیز در تحقیقات نشان داده که قادر به مهار مسیر التهابی سیکلواکسیژناز و جلوگیری از تشکیل فاکتورهای التهابی مانند پروستاگلندین است. دارچین حاوی سینامالدهید، اوژنول و سینامیک اسید است و می تواند باعث افزایش اشتها و رفع مشکلات گوارشی گردد. همچنین قادر به کاهش آزادسازی عوامل ایمنی دخیل در التهاب می باشد.

■ - این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۴۰ میلی گرم مشتقات هیدروکسی آنتراسن بر مبنای باربالوئین در هر قرص استاندارد شده است.

■ موارد مصرف:

مفید در بیماری های سر و اعصاب، پاکسازی معده، بهبود درد مفاصل، بهبود سستی مثانه.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق نظر پزشک و یا هر شب ۲ قرص تا ۱۵ شب همراه عسل و آب ولرم میل گردد.



تداخلات دارویی:

دیگوکسین، وارفارین، داروهای ضد دیابت و سایر ترکیبات آنتراکینونی.

■ عوارض جانبی:

- احتمال بروز اسهال، دلپیچه و سوزش مقعد وجود دارد.
- استفاده طولانی مدت از این فرآورده به دلیل اختلال در آب و الکترولیت می تواند در برخی موارد باعث کاهش پتاسیم خون و ضعف عضلانی گردد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:


- در صورت وجود حساسیت شناخته شده به هریک از اجزای فرآورده و در هموروئید و شقاق مگر با نظر پزشک از مصرف دارو خودداری نمایید.
- در بیماری های التهابی روده و انسداد مجاری گوارشی منع مصرف دارد.
- در افراد دچار مشکلات کلیوی شدید، توصیه نمی گردد.
- در مصرف این فرآورده در اطفال زیر ۱۲ سال، احتیاط کامل نموده و توصیه نمی شود.
- قبل از مصرف با پزشک متخصص مشورت نمایید. دارو را بیش از مقدار توصیه شده مصرف ننمایید.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:

منوع می باشد.

■ شرایط نگهداری:

دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید
دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



Niak Ayaraj fiqra
tablet

قرص دودرتریپ

<i>Terminalia chebula</i>	<i>Miroblanus citrina</i>	هلیله زرد
<i>Terminalia chebula</i>	<i>Mirobalanus nigrae</i>	هلیله سیاه
<i>Terminalia belerica Roxb</i>	<i>Belleric myrobalan</i>	بلبله
<i>Phyllanthus emblica</i>	<i>Emblc myrobalan</i>	آمله
<i>Ipomoea turpethum</i>	<i>Trupeth</i>	ترید
<i>Pimpinella anisum</i>	<i>Aniseed</i>	انیسون
<i>Cuscuta epithymum</i>	<i>Dodder</i>	افتیمون
<i>Rosa damascena Mill</i>	<i>Rose water</i>	گللاب
<i>Echium amoenum</i>	<i>Oxtongue</i>	عرق گاو زبان

مواد جانبی: منیزیم استئارات، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، عسل مصفی، روغن بنفشه بادام.

■ بسته بندی:

۱۰۰ عدد قرص در بسته بندی قوطی در جعبه برشوردار.

■ معرفی فرآورده:

اطریشل مغرب کلمه تری پهلای (Triphala) هندی بوده که به ترکیبات حاوی هلیله، بلبله و آمله گفته می‌شده است. دودرتریپ یا اطریشل افیتونی علاوه بر ترکیبات مذکور حاوی گیاهان دیگری است که آرام بخش و مفید برای کبد می‌باشند. از آنجا که در بسیاری از موارد مشکلات کبدی و گوارشی موجب بروز سردرد روزانه، میگرن و خستگی می‌گردد، لذا وجود این ترکیبات باعث شده تا در کنار ترکیبات آرامبخش (همچون گاو زبان و گل سرخ) فرآورده، اثربخشی مناسبی در درمان اینگونه مشکلات عصبی داشته باشد.

در طب سنتی فرآورده جهت پاکسازی معده، تنقیه مغز، دفع سودا و بلغم و همچنین درمان مالیخولیا که همان افسردگی و وسواس می‌باشد، مورد مصرف قرار می‌گرفته است.

■ این فرآورده براساس وجود حداقل ۱ درصد ترکیبات فنلی برحسب گالیک اسید استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:

بلبله دارای تانن و ترکیبات فنلی است و اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریال از خود نشان می‌دهد.

گل گاوزبان حاوی ترکیبات فنلی و سیانیدین ها است که طبق تحقیقات اثرات ضد اضطراب و افسردگی گیاه را به دلیل وجود آن‌ها می‌دانند. همچنین این گیاه باعث مهار فاکتورهای التهابی مانند مسیر سیکلواکسیژناز می‌گردد. گل سرخ دارای مقادیر قابل توجهی از آسکوربیک اسید (ویتامین ث)، فلاونوئیدها و اسیدهای چرب بلند غیراشباع است و طبق مطالعات باعث بروز خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد افسردگی و جلوگیری از آتروفی رشته‌های عصبی توسط بتا-آمیلوئید می‌شود. در مطالعات نشان داده شده که افیتمون می‌تواند باعث افزایش رهاسازی و فعال شدن گیرنده‌های گابا شود.



■ موارد مصرف:

- مفید جهت رفع سردرد.
- پاکسازی کننده مغز و دستگاه گوارش از بلغم و سودا.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق دستور پزشک و یا ۳ بار در روز و هر بار ۳ قرص میل گردد.

■ عوارض جانبی:

افتیمون و ترید خاصیت ملینی داشته و بنابراین ممکن است موجب لینت مزاج یا کرامپ شکمی گردد که میزان آن در طول دوره درمان کاهش می‌یابد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- در صورت مصرف همزمان با داروهای ملین، دوز داروها کاهش یابد.
- دوره درمان حداقل ۴-۸ هفته می‌باشد، لذا مصرف دارو را تا پایان دوره درمان بطور منظم مصرف ننمائید.
- در صورت فراموش نمودن یک دوز، دوز بعدی را در زمان خود مصرف نموده و از افزایش دوز اجتناب ننمائید.
- این دارو مسکن نبوده بلکه باعث التیام کامل درد بعد از یک دوره درمان می‌شود.
- در صورت وجود حساسیت شناخته شده به هریک از اجزای فرآورده از مصرف آن خودداری کنید.

■ تداخلات دارویی:

به دلیل وجود افیتمون و ترید احتمال تشدید اثر محصولات ملین وجود دارد.

■ مصرف در بارداری:

به دلیل احتمال ایجاد اسپاسم عضلات صاف، مصرف دارو در بارداری توصیه نمی‌گردد.

■ مصرف در شیردهی:

احتیاط مصرف دارد، البته ممکن است موجب تغییرطعم شیر و ایجاد اسهال و دل پیچه برای نوزاد گردد.

■ شرایط نگهداری:

دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید. دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



Doddertrip
tablet

Capsicum annuum	Oleoresin Capsicum	۱/۵٪ اولئورزین کاپسیکوم
-----------------	--------------------	-------------------------

مواد جانبی: وازلین، پارافین مایع، ستیل الک.

■ بسته بندی:

پماد در تیوب های ۳۰ گرمی در جعبه برشوردار.

■ معرفی فرآورده:

این فرآورده حاوی ۱/۵٪ اولئورزین کاپسیکوم می باشد که از گیاه فلفل با نام علمی Capsicum annuum از تیره سیب زمینی Solanaceae بدست می آید. کاپسایسین با نام علمی (ای)-ان-(۴)-هیدروکسی - ۳- متوکسی فنیل) متیل- ۸- متیل نون- ۶- انامید.

■ این فرآورده براساس حداقل ۰/۰۲ درصد کاپسایسین استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:

در کتاب E commission آلمان به خاصیت افزایش جریان خون ناشی از این ماده اشاره شده است. همچنین خاصیت ضد درد موضعی این ماده تایید شده است. هر چند مکانیسم عملکرد کاپسایسین کاملاً مشخص نیست حدس بر این است که این ماده باعث تخلیه Substance P و جلوگیری از تجمع دوباره آن در اعصاب محیطی می شود که تصور می شود ماده P واسطه شیمیایی اصلی انتقال پالس های درد از محیط به اعصاب مرکزی می باشد. همچنین کاپسایسین با ایجاد دیپولاریزاسیون ها و پتانسیل های عمل متعدد در رشته های عصبی باعث از بین رفتن حساسیت آکسون های حسی و جلوگیری از انتقال پیام درد می شود.



موارد مصرف:

ضد درد موضعی، اسپاسم های عضلانی دردناک در ناحیه کتف، بازو و ستون فقرات، آرتريت، روماتیسم نورالژی، لومباگو.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق دستور پزشک و یا روزانه ۳ الی ۴ بار برحسب نیاز در موضع درد مالیده و ماساژ داده شود.

■ عوارض جانبی:

تا کنون عوارض جانبی سیستمیک برای این دارو گزارش نشده است. در برخی موارد ممکن است باعث سوزش، قرمزی و تورم ناحیه شود.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- از تماس این دارو با چشم ها، نواحی مخاطی و زخم های باز جداً خودداری شود و در صورت تماس با چشم و مخاط با آب ولرم موضع را شستشو دهید.
- این دارو فقط برای مصارف جلدی می باشد. بعد از استفاده دست های خود را کاملاً با آب و صابون بشویید.
- در صورت بلعیدن تصادفی دارو به پزشک مراجعه شود.
- در صورتیکه بعد از ۲ روز بهبودی حاصل نشد ۴روز از استعمال اول باید بگذرد و مجدداً استفاده شود.
- در دفعات ابتدایی مصرف ممکن است احساس سوزش بیشتر باشد که به مرور کاهش می یابد.
- قبل از فعالیت های ورزشی استفاده نشود.
- تا حد ممکن از قرار دادن ناحیه آغشته به پماد در مقابل آفتاب خودداری نمایید.
- بهتر است برای استفاده از پماد از یک دستکش پلاستیکی یا یک قطعه پنبه استفاده نمایید.
- بعد از هربار مصرف درب تیوب را محکم ببندید.
- از دوش آب داغ، بلافاصله قبل و بعد از مصرف فرآورده پرهیز شود.
- بر روی پوست صدمه دیده و ملتهب استفاده نگردد.
- در بیماری که به فلفل حساسیت دارند از مصرف فرآورده پرهیز گردد.

■ تداخلات دارویی:

در مصرف موضعی تداخل خاصی در منابع علمی گزارش نشده است.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:

با احتیاط و طبق نظر پزشک مصرف گردد.

■ شرایط نگهداری:

دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید. دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

پماد

کاپودرم



Capoderm
Ointment



شربت سريكوهرپ



قرص والی فلور



قرص تبوکان



قرص نیاک ایارج فیکرا



قرص لاون تریپ



قرص دودر تریپ



کپسول اسکوفیت



برگشت به فهرست اصلی

شربت

سریکوهرب

<i>Bombyx mori</i>	Silkworm cocoon	پيله ابريشم
<i>Crocus sativus</i>	Saffron	زعفران
<i>Pistacia lentiscus</i>	Mastic	مصطكى
<i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Cinnamon	دارچين
<i>Cinnamomum tamala</i>	Indian bay leaf	ساذ هندی
<i>Eugenia caryophyllata</i>	Clove	میخک
<i>Doronicum Pardalianchs</i>	Leopard's bane	دروغ عقربی
<i>Santalum album</i>	Sandal wood	صندل سفید
	Gold leaf	ورق طلا

مواد جانبی: عنبر اشهب، عسل، گلاب، عرق بیدمشک، قند سفید.

■ بسته بندی:

شربت در بطری های ۲۰۰ میلی لیتری در جعبه برشودار.

■ معرفی فرآورده:

فرآورده ای است حاوی گیاهان و اجزایی برگرفته از متون طب سنتی مانند ابریشم، زعفران، میخک، صندل و دارچین که علاوه بر اثربخشی مناسب، عوارضی ناچیز دارد و بر خلاف سایر داروهای آرام بخش فاقد عوارضی همچون گیجی و خواب آلودگی می باشد. در طب سنتی این فرآورده به عنوان مقوی اعصاب رئیس شامل (کبد، قلب، مغز)، مقوی روح و مقوی حافظه و جهت پاکسازی مغز و دفع بلغم مصرف می گردد.

■ این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۱ میلی گرم ترکیبات فنلی بر حسب گالیک اسید در هر میلی لیتر استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:

پيله ابريشم حاوی پلی پپتیدی به نام سربیسین است. طبق مطالعات این پپتید با سلول های شوان سازگار است و می تواند باعث تحریک ترشح فاکتور رشد رشته های عصبی شود و به بازسازی آنها در اعصاب سیاتیک کمک نماید. این پپتید در افزایش مهارت های یادگیری موثر بوده و با افزایش استیل کولین و مهار استیل کولین استراز می تواند به تقویت حافظه کمک نماید.

زعفران حاوی مواد موثره کروسین، سافرانال و کاروتن ها است و در مطالعات و در مقایسه با داروهای معمول ضد افسردگی مانند ایمی پرامین و فلوکستین خاصیت ضد افسردگی مناسبی از خود نشان داده است بدون آنکه عوارضی مانند عوارض این داروها را از خود بروز دهد.

عرق بیدمشک نیز در تحقیقات اثرات ضد استرس و التهاب از خود بروز داده است. طبق مطالعات دارچین، میخک، زعفران، صندل سفید و ساذج هندی اثرات آنتی اکسیدانی دارند که در مبارزه با رادیکال های آزاد و عوامل مخرب حافظه موثرند.



■ موارد مصرف:

مقوی اعصاب رئیس بدن (قلب، مغز و کبد)، تقویت روحیه، برطرف کننده فشارهای عصبی ناشی از افسردگی، نشاط آور. در طب سنتی از این فرآورده بعنوان تقویت کننده سیستم ایمنی، پاکسازی و محافظت از کبد، رفع مشکلات گوارشی، کمک به بهبود افسردگی، بهبود خفقان، باردو، ریاخ و بواسیر یاد شده است.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق دستور پزشک و یا روزانه ۲ قاشق غذاخوری از شریت را در یک لیوان آب ولرم حل نموده و میل نمایید.

■ عوارض جانبی:

تا کنون موردی گزارش نشده است اما ممکن است اثر داروهای مشابه را تشدید کند.

■ تداخلات دارویی:

ممکن است موجب تشدید اثرات سایر داروهای مشابه گردد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- در صورت عدم مصرف هم زمان با سایر داروهای مؤثر بر اعصاب با مشورت پزشک دوز داروها می بایست تعدیل گردد.

■ شروع اثرات ممکن است سریع نباشد و با کمی تأخیر صورت گیرد.

■ دارو را به صورت منظم و در ساعت مشخص مصرف نموده و دوره درمان را کامل کنید.

■ جهت اثربخشی بهتر و کاهش عوارض، دارو را همراه با عرق بید، عرق بید مشک و یا عرق گاو زبان مصرف نمایید.

■ به دلیل وجود شکر و عسل، در افراد مبتلا به دیابت با نظر پزشک استفاده گردد.

■ مصرف همزمان فرآورده با داروهای رقیق کننده خون احتیاط مصرف دارد و می تواند باعث افزایش اثرات آن ها گردد.

■ در صورت وجود حساسیت شناخته شده به هر یک از اجزاء فرآورده.

■ به دلیل وجود صندل سفید، استفاده از این فرآورده در افراد مبتلا به بیماری های کلیوی توصیه نمی گردد.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:

توصیه نمی گردد مگر به دستور پزشک معالج.

■ شرایط نگهداری :

دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید.

دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



Sericoherb
syrup

Valeriana officinalis	Valerian	والرین (سنبل الطیب)
Passiflora incarnata	Passion flower	گل ساعتی

مواد جانبی: لاکتوز، نشاسته، میکرو کریستالین سلولز، سدیم کراس کارملوز، پوپیون، استئارات منیزیم، شکر، ژلاتین، تالک، کرینات کلسیم، سوربیتول، پلی اتیلن گلیکول ۴۰۰۰، رنگ آبی مجاز خوراکی

■ بسته بندی:

۳۰ عدد قرص با روکش قندی در بسته بندی قوطی در جعبه بروشوردار.

■ معرفی فرآورده:

این فرآورده حاوی ۱۰۰ میلی گرم عصاره خشک والرین و ۳۰ میلی گرم عصاره خشک گل ساعتی می باشد. عصاره پاسیفلور: از سرشاخه های *Passiflora Incarnata* (گل ساعتی) تهیه می شود که بومی مناطق مرطوب آمریکا است و قرن ها توسط سرخپوستان آمریکا به عنوان آرام بخش و ضد تشنج مصرف می شده و در سال های اخیر نیز این گیاه مصرف گسترده و روز افزونی در اروپا و آمریکا پیدا کرده است. عصاره والرین: از ریزوم و ریشه های گیاه *Valeriana officinalis* (سنبل الطیب) تهیه می شود که این گیاه بومی اروپا و مناطق گرمسیر و مرطوب آسیا بوده و مصرف این گیاه از قرن هشتم به عنوان دارو در اروپا معمول گردیده است. در یک مطالعه بالینی بر روی این محصول در بیمارستان شریعتی تهران، نشان داده شد که می تواند باعث کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی گردد.

■ این فرآورده براساس وجود حداقل ۰/۶ میلی گرم فلوئوئید تام بر حسب ویتکسین در هر قرص استاندارد گردیده است.

■ مکانیسم اثر:

تحقیقات اخیر نشان داده است که بعد از مصرف والرین غلظت گابا در فضای سیناپسی افزایش می یابد. همچنین معلوم شده که عصاره تام والرین موجب افزایش ترشح گابا از سیناپتوزوم ها می گردد. عصاره گل ساعتی نیز بازجذب GABA - [3H] را در فضای سیناپسی مهار می نماید اما روی ترشح آن اثری ندارد. والرینک اسید موجود در عصاره والرین باعث افزایش ترشح گابا و کاهش تخریب آن و همچنین کاهش زمان القای خواب می شود. بنزوفلاوون موجود در گل ساعتی باعث بهبود کیفیت خواب و کاهش اضطراب می شود. آپی ژنین موجود در گل ساعتی باعث اثر ضد اسپاسم گوارشی می شود.

■ موارد مصرف:

در اضطراب و بیخوابی های ناشی از آن، بی قراری و همچنین به عنوان یک داروی آرام بخش مصرف می شود. می تواند در اسپاسم های گوارشی ناشی از استرس های عصبی موثر باشد.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق نظر پزشک و یا:
جهت کاهش اضطراب: ۱ تا ۲ قرص، ۳ بار در روز، نیم ساعت بعد از غذا.
خواب آور: ۱ تا ۲ قرص نیم ساعت قبل از خواب.

■ عوارض جانبی:

- ممکن است در برخی از افراد باعث بروز مشکلات گوارشی گردد.
- در برخی از موارد باعث رویاهای شبانه می گردد.

■ تداخلات دارویی:

- ممکن است موجب افزایش اثرات دیگر آرام بخش ها و خواب آورها شود.
- از مصرف همزمان با بنزودیازپین پرهیز گردد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- در صورت وجود حساسیت به هر یک از اجزا از مصرف دارو خودداری شود.
- نارسایی کبدی.
- در افرادی که دیگر داروهای موثر بر سیستم اعصاب را مصرف می نمایند بدون تجویز پزشک مصرف نگردد و تغییر در داروهای قبلی داده نشود.
- شروع اثرات ممکن است سریع نبوده و با تاخیر بروز نماید.
- از مصرف این دارو همراه با الکل پرهیز نمایید.
- از فعالیت هایی که نیاز به هوشیاری کامل دارد، بپرهیزید.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:

مطالعات کافی وجود ندارد، ترجیحا مصرف نگردد.

■ شرایط نگهداری:

دارو رادر دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید.
دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.

قرص والی فلور



Valiflore
tablet

قرص تبوکان

Ginkgo biloba

Ginkgo

عصاره خشک برگ گیاه جینکو

مواد جانبی: لاکتوز، میکروکریستالین سلولز، نشاسته ذرت، تالک، استئارات منیزیم، سیلیکون دی اکساید، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰، پلی اتیلن گلیکول ۴۰۰، اکسید آهن قرمز، دی اکسید تیتان.

■ بسته بندی:

قرص روکش دار حاوی ۳ ورق پلیستر ۱۰ عددی در جعبه بروشوردار.

■ معرفی فرآورده:

جینکو یکی از قدیمی ترین گونه های درختی است که تاکنون به حیات خود ادامه داده است. این گیاه ریشه در چین دارد و در قرن ۱۸ میلادی به اروپا وارد شده است. هر قرص تبوکان حاوی ۴۰ میلی گرم عصاره خشک و خالص شده برگ های گیاه *Ginkgo biloba* است. گیاه جینکو حاوی مواد موثره متعددی از جمله فلاونوئیدها است و توان آنتی اکسیدانی بالایی دارد.

■ - این فرآورده براساس ۸/۸ - ۱۰/۸ میلی گرم فلاونوئید بر حسب فلاوون گلیکوزید در هر قرص استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:

جینکو حاوی مواد موثره متعددی از جمله فلاونوئیدها، پروآنتوسیانیدین ها، لاکتون دی ترین ها مانند جینکولیدها است و توان آنتی اکسیدانی بالایی دارد و از ایسکمی جلوگیری می کند. این گیاه از پراکسیداسیون لیپیدها که باعث تخریب بافت ها، عروق و نورون ها می شود جلوگیری می کند همچنین باعث افزایش خورسانی به اندام ها مانند مغز می شود. این گیاه اثرات اسپاسمولیتیک با تاثیر مستقیم بر گیرنده های آلفا-آدرنرژیک دارد. جینکولید B باعث مهار فاکتور فعال کننده پلاکتی (PAF) می شود.



■ موارد مصرف:

- بهبود عملکرد مغز و تقویت حافظه.
- بهبود تعادل در اختلال ضعف تعادلی.
- سرگیجه و وزوز گوش با منشأ عروقی.
- لنگش متناوب.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق دستور پزشک و یا ۳ بار در روز، هر بار ۱ عدد قرص مصرف گردد.

■ عوارض جانبی:

تاکنون عارضه خاصی گزارش نشده اما در موارد نادر می تواند باعث مشکلات گوارشی، حساسیت و سردرد شود.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- در افراد با سابقه حساسیت بالا به فرآورده های جینکو مصرف نگردد.
- در افراد دارای ریسک خونریزی داخل جمجمه ای منع مصرف دارد.
- مصرف طولانی مدت آن در افراد دچار ریسک خونریزی توصیه نمی شود زیرا می تواند زمان خونریزی را افزایش دهد.
- اثرات داروهای مهار کننده تجمع پلاکت ها در مصرف همزمان با این دارو تشدید می گردد.

■ تداخلات دارویی:

اثرات داروهای مهارکننده تجمع پلاکت ها و ضد انعقاد خون در مصرف همزمان با این دارو تشدید می گردد.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف نگردد، مگر با تجویز پزشک.

■ شرایط نگهداری:

در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری شود. دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



TebokaN
Tablet

<i>Aloe perryi</i>	Aloe	صبر زرد
<i>Crocus sativus</i>	Saffron	زعفران
<i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Cinnamon	دارچین
<i>Cinnamomum iners</i>	Chinese cinnamon	سلیخه
<i>Pistacia lentiscus</i>	Mastic	مصطکی
<i>Commiphora opobalsamum</i>	Balsam of mecca	چوب بلسان
<i>Commiphora opobalsamum</i>	Balsam of mecca	حب(دانه) بلسان
<i>Asarum europaeum</i>	Indian valerian	اسارون
<i>Nardostachys jatamansi</i>	Muskroot	سنبل الطیب

مواد جانبی: سیلیکون دی اکساید، تالک، منیزیم استئارات، نشاسته دارویی

قرص نیاک ایاراج فیقرا

■ بسته بندی:

۳۰ عدد قرص در بسته بندی قوطی در جعبه برشودار.

■ مکانیسم اثر:

صبر زرد نیز در تحقیقات نشان داده که قادر به مهار مسیر التهابی سیکلواکسیژناز و جلوگیری از تشکیل فاکتورهای التهابی مانند پروستاگلندین است. دارچین حاوی سینامالدهید، اوژنول و سینامیک اسید است و می تواند باعث افزایش اشتها و رفع مشکلات گوارشی گردد. همچنین قادر به کاهش آزادسازی عوامل ایمنی دخیل در التهاب می باشد.

■ - این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۴۰ میلی گرم مشتقات هیدروکسی آنتراسن بر مبنای باربالوئین در هر قرص استاندارد شده است.

■ موارد مصرف:

مفید در بیماری های سر و اعصاب، پاکسازی معده، بهبود درد مفاصل، بهبود سستی مثانه.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق نظر پزشک و یا هر شب ۲ قرص تا ۱۵ شب همراه عسل و آب ولرم میل گردد.



تداخلات دارویی:

دیگوکسین، وارفارین، داروهای ضد دیابت و سایر ترکیبات آنتراکینونی.

■ عوارض جانبی:

- احتمال بروز اسهال، دلپیچه و سوزش مقعد وجود دارد.
- استفاده طولانی مدت از این فرآورده به دلیل اختلال در آب و الکترولیت می تواند در برخی موارد باعث کاهش پتاسیم خون و ضعف عضلانی گردد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:


- در صورت وجود حساسیت شناخته شده به هریک از اجزای فرآورده و در هموروئید و شقاق مگر با نظر پزشک از مصرف دارو خودداری نمایید.
- در بیماری های التهابی روده و انسداد مجاری گوارشی منع مصرف دارد.
- در افراد دچار مشکلات کلیوی شدید، توصیه نمی گردد.
- در مصرف این فرآورده در اطفال زیر ۱۲ سال، احتیاط کامل نموده و توصیه نمی شود.
- قبل از مصرف با پزشک متخصص مشورت نمایید. دارو را بیش از مقدار توصیه شده مصرف ننمایید.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:

منوع می باشد.

■ شرایط نگهداری:

دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید
دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



Niak Ayaraj fiqra
tablet

قرص

لاون تریپ

<i>Terminalia chebula</i>	Mirobalanus citrina	هلیله زرد
<i>Terminalia chebula</i>	Mirobalanus nigrae	هلیله سیاه
<i>Terminalia chebula</i>	Mirobalanus chebula	هلیله کابلی
<i>Lavandula angustifolia Mill</i>	Lavender	اسطوخودوس
<i>Terminalia belerica Roxb</i>	Belleric myrobalan	بلبله
<i>Ipomoea turpethum R.Br</i>	Turpeth	ترید
<i>Phyllanthus Emblica L</i>	Emblie myrobalan	آمله
<i>Cassia angustifolia</i>	Senna	سنا
<i>Polypoduim vulgare Linn</i>	Common polypody	بسفایچ

مواد جانبی: روغن بادام شیرین، عسل مصفی، منیزیم استئارات، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز

■ بسته بندی:

۱۰۰ عدد قرص در بسته بندی قوطی در جعبه برشوردار.

■ معرفی فرآورده:

اثریفل مغرب کلمه تری پهلای (Triphala) هندی بوده که به ترکیبات حاوی هلیله، بلبله و آمله گفته می‌شده است. لاون تریپ با اثریفل اسطوخودوسی علاوه بر گیاهان یاد شده، حاوی اسطوخودوس بوده که دارای اثرات ضد افسردگی، مقوی اعصاب و آرامش بخش می باشد. با توجه به اینکه طبق نظر اساتید و پزشکان طب سنتی یکی از دلایل ناراحتی‌های عصبی اختلالات کبدی و گوارشی است لذا در این محصول از گیاهان موثر بر کبد و مسهل های سودا همچون بسفایچ، ترید و سنا استفاده شده است. در طب سنتی در مواردی همچون نافع در بیماری‌های مغز و اعصاب ناشی از سوء مزاج بلغمی و سوداوی از آن یاد شده است.

■ این فرآورده براساس وجود حداقل ۳ درصد ترکیبات فنلی برحسب گالیک اسید در هر قرص استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:

هلیله حاوی تانن، اسیدهای میوه و اسیدهای چرب است و در کاهش کلسترول موثر است. همچنین این گیاه دارای ماده موثره‌ای به نام چپولازیک اسید است که با مهار مالتاز و آلفا-گلوکوزیداز باعث مهار جذب قندها و کمک به درمان دیابت می‌شود. بلبله نیز دارای تانن و ترکیبات فنلی است و اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریال از خود نشان می‌دهد. آمله حاوی آسکوربیک اسید (ویتامین ث) و ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی است و توان آنتی اکسیدانی بالایی دارد و طبق برخی مطالعات می‌تواند به تشکیل موکوس در دستگاه گوارش کمک کرده و باعث بهبود زخم های گوارشی شود. اسطوخودوس حاوی روغن قرار نسبتاً قابل توجهی است و بیشترین قسمت روغن قرار را لینالول و لینالیل استات تشکیل می‌دهد که اثرات آرام بخشی و ضد اضطراب این گیاه را به آن‌ها نسبت می‌دهند زیرا در مطالعات دیده شده که با گیرنده های NMDA و ناقل‌های سروتونین برهم کنش دارند. بسفایچ حاوی مواد موثره سایونین و پلی پودین A,B است که اثرات آرامبخشی عصبی این گیاه را به این دو ماده نسبت می‌دهند. در برخی مطالعات اثر تحریکی بتا-آدرنوسپتور از این گیاه دیده شده که آن را به دلیل وجود کافئیک اسید می‌دانند.



■ موارد مصرف:

- مقوی مغز و اعصاب.
- مفید در بیماری های عصبی.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق دستور پزشک و یا هر ۱۲ ساعت ۲ عدد مصرف گردد.

■ عوارض جانبی:

سنا و ترید خاصیت ملینی داشته و بنابراین ممکن است موجب لینت مزاج یا کرامپ شکمی گردد که میزان آن در طول دوره درمان کاهش می‌یابد.

■ تداخلات دارویی:

به دلیل وجود ترید، سنا و بسفایچ اثر فرآورده‌های ملین و مسهل تشدید می‌گردد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- دوره درمان حداقل ۱ الی ۲ ماه می‌باشد، لذا مصرف دارو را تا پایان دوره درمان بطور منظم مصرف نمایید.
- در صورت فراموش نمودن یک دوز، دوز بعدی را در زمان خود مصرف نموده و از افزایش دوز بعدی اجتناب نمایید.
- در صورت وجود حساسیت به هر یک از اجزا از مصرف دارو خودداری شود.

■ مصرف در بارداری:

به دلیل احتمال بروز کرامپ و اسپاسم عضلات صاف، مصرف دارو در بارداری توصیه نمی‌شود.

■ مصرف در شیردهی:

طبق نظر پزشک؛ ممکن است موجب تغییرطعم شیر و ایجاد اسهال و دل پیچه برای نوزاد گردد.

■ شرایط نگهداری:

دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید.
دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



Laventrip
tablet

قرص دودرتریپ

<i>Terminalia chebula</i>	<i>Miroblanus citrina</i>	هلیله زرد
<i>Terminalia chebula</i>	<i>Mirobalanus nigrae</i>	هلیله سیاه
<i>Terminalia belerica Roxb</i>	<i>Belleric myrobalan</i>	بلبله
<i>Phyllanthus emblica</i>	<i>Emblc myrobalan</i>	آمله
<i>Ipomoea turpethum</i>	<i>Trupeth</i>	ترید
<i>Pimpinella anisum</i>	<i>Aniseed</i>	انیسون
<i>Cuscuta epithymum</i>	<i>Dodder</i>	افتیمون
<i>Rosa damascena Mill</i>	<i>Rose water</i>	گللاب
<i>Echium amoenum</i>	<i>Oxtongue</i>	عرق گاو زبان

مواد جانبی: منیزیم استئارات، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، عسل مصفی، روغن بنفشه بادام.

■ بسته بندی:

۱۰۰ عدد قرص در بسته بندی قوطی در جعبه برشوردار.

■ معرفی فرآورده:

اطریشل مغرب کلمه تری پهلای (Triphala) هندی بوده که به ترکیبات حاوی هلیله، بلبله و آمله گفته می‌شده است. دودرتریپ یا اطریشل افیتونی علاوه بر ترکیبات مذکور حاوی گیاهان دیگری است که آرام بخش و مفید برای کبد می‌باشند. از آنجا که در بسیاری از موارد مشکلات کبدی و گوارشی موجب بروز سردرد روزانه، میگرن و خستگی می‌گردد، لذا وجود این ترکیبات باعث شده تا در کنار ترکیبات آرامبخش (همچون گاو زبان و گل سرخ) فرآورده، اثربخشی مناسبی در درمان اینگونه مشکلات عصبی داشته باشد.

در طب سنتی فرآورده جهت پاکسازی معده، تنقیه مغز، دفع سودا و بلغم و همچنین درمان مایخولیا که همان افسردگی و وسواس می‌باشد، مورد مصرف قرار می‌گرفته است.

■ این فرآورده براساس وجود حداقل ۱ درصد ترکیبات فنلی برحسب گالیک اسید استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:

بلبله دارای تانن و ترکیبات فنلی است و اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریال از خود نشان می‌دهد.

گل گاوزبان حاوی ترکیبات فنلی و سیانیدین ها است که طبق تحقیقات اثرات ضد اضطراب و افسردگی گیاه را به دلیل وجود آن‌ها می‌دانند. همچنین این گیاه باعث مهار فاکتورهای التهابی مانند مسیر سیکلوآکسیژناز می‌گردد. گل سرخ دارای مقادیر قابل توجهی از آسکوربیک اسید (ویتامین ث)، فلاونویدها و اسیدهای چرب بلند غیراشباع است و طبق مطالعات باعث بروز خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد افسردگی و جلوگیری از آتروفی رشته‌های عصبی توسط بتا-آمیلوئید می‌شود. در مطالعات نشان داده شده که افیتمون می‌تواند باعث افزایش رهاسازی و فعال شدن گیرنده‌های گابا شود.



■ موارد مصرف:

- مفید جهت رفع سردرد.
- پاکسازی کننده مغز و دستگاه گوارش از بلغم و سودا.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق دستور پزشک و یا ۳ بار در روز و هر بار ۳ قرص میل گردد.

■ عوارض جانبی:

افتیمون و ترید خاصیت ملینی داشته و بنابراین ممکن است موجب لینت مزاج یا کرامپ شکمی گردد که میزان آن در طول دوره درمان کاهش می‌یابد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- در صورت مصرف همزمان با داروهای ملین، دوز داروها کاهش یابد.
- دوره درمان حداقل ۴-۸ هفته می‌باشد، لذا مصرف دارو را تا پایان دوره درمان بطور منظم مصرف ننمائید.
- در صورت فراموش نمودن یک دوز، دوز بعدی را در زمان خود مصرف نموده و از افزایش دوز اجتناب ننمائید.
- این دارو مسکن نبوده بلکه باعث التیام کامل درد بعد از یک دوره درمان می‌شود.
- در صورت وجود حساسیت شناخته شده به هریک از اجزای فرآورده از مصرف آن خودداری کنید.

■ تداخلات دارویی:

به دلیل وجود افیتمون و ترید احتمال تشدید اثر محصولات ملین وجود دارد.

■ مصرف در بارداری:

به دلیل احتمال ایجاد اسپاسم عضلات صاف، مصرف دارو در بارداری توصیه نمی‌گردد.

■ مصرف در شیردهی:

احتیاط مصرف دارد، البته ممکن است موجب تغییرطعم شیر و ایجاد اسهال و دل پیچه برای نوزاد گردد.

■ شرایط نگهداری:

دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید. دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



Doddertrip
tablet

کپسول اسکوفیت

<i>Rheum palmatum</i>	Rhubarb	ریوند چینی
<i>Zingiber officinale</i>	Ginger	زنجبیل
<i>Datura stramonium</i>	Datura	تاتوره

■ بسته بندی:
۱۰۰ عدد کپسول در بسته‌بندی قوطی در جعبه برشوردار.

■ معرفی فرآورده:
ترکیبی است حاوی گیاهانی همچون ریوند چینی با نام علمی (*Rheum Palmatum*) و تاتوره با نام علمی (*Datura stramonium*) که دارای خواصی از جمله ضد التهاب و قابض می‌باشند.

■ این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۸/۰ درصد آلکالوئیدهای کل بر مبنای هیوسامین در هر کپسول استاندارد شده است.



موارد مصرف:
- داروی کمکی جهت درمان عوارض ناشی از سندرم ترک اعتیاد به مخدرات افیونی.
- درمان سردرد مزمن.
- تقویت معده و کبد.

■ مقدار و نحوه مصرف:
طبق دستور پزشک و یا روزانه ۱ تا ۲ کپسول میل شود. دارو را بیش از مقدار ۲ کپسول در روز مصرف نکنید.

■ عوارض جانبی:
- مصرف میزان بالای دارو موجب خشکی دهان، سرخی پوست، اختلال حواس، احتباس ادرار می‌شود.
- به دلیل وجود ریوند چینی ممکن است باعث ناراحتی گوارشی مانند گرفتگی یا اسپاسم گردد.
- به دلیل وجود زنجبیل نیز ممکن است عوارضی مانند ناراحتی شکمی، سوزش سردل، اسهال، اثر تحریک کننده‌ای مثل فلفل در دهان و گلو به همراه داشته باشد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:
- التهاب پروستات، آریتمی، ادم تنفسی حاد و التهاب روده، افرادی که دچار احتسابات ادرار و تصلب عروق کرونر می‌باشند با احتیاط و تحت نظر پزشک مصرف نمایند.
- در صورت حساسیت به هریک از اجزای فرآورده از مصرف آن خودداری کنید.

■ تداخلات دارویی:
این دارو می‌تواند با سایر داروهای آنتی‌کولینرژیک تداخل ایجاد کند.

■ مصرف در دوران بارداری و شیردهی:
مجاز نمی‌باشد.

■ شرایط نگهداری:
دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید.
دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



Scophyt
Capsule



شربت صافی کامپاند



شربت نیاک
زیزیفویس اکسیمل



قرص فیت آیرون



قرص آلیکوم



قرص تبوکان



کپسول ذیابیطس



کپسول نیاک بزوار



برگشت به فهرست اصلی

شریت

صافی کامپاند

<i>Smilax china</i> L	China root	چوب چینی
<i>Echium amoenum</i> fch.et mey	Oxtongue flower	گل گاو زبان
<i>Melissa officinalis</i>	Lemon balm	بادرنجوبیه
<i>Fumaria officinalis</i>	Fumitory	شاهتره
<i>Rosa damascena</i>	Red rose	گل محمدی
<i>Salix aegyptiaca</i> L	Musk willow	بیدمشک

مواد جانبی: عسل.

■ بسته بندی:

شریت در بطری های ۲۰۰ میلی لیتری در جعبه برشوردار.

■ معرفی فرآورده:

این شریت فرآورده ای است غنی از آنتوسیانین ها و ترکیبات آنتی اکسیدان و ترکیباتی که موجب بهبود عملکرد کبد و قلب می گردند. مورد مصرف متداول آن در طب سنتی رفع امراض پاره مزمنه، مقوی اعضای رئیس و تصفیه کننده خون می باشد.

■ این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۷۵/۰ میلی گرم ترکیبات فنلی بر حسب گالیک اسید در هر میلی لیتر استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:

طبق مطالعات چوب چینی دارای خواص ضد تجمع پلاکتی و بهبود جریان خون است همچنین به علت وجود ماده موثره ساپونین استروئیدی در آن خواص دیورتیک نیز دارد.

گل سرخ دارای مقادیر بالای آسکوربیک اسید و فلاونوئید است و توان آنتی اکسیدانی بالایی دارد. بادرنجوبیه به علت داشتن ترکیبات فلاونوئیدی مانند ایزوکوئرستین دارای توان آنتی اکسیدانی بالایی است. همچنین بادرنجوبیه دارای خاصیت ضد اضطراب نیز می باشد.



■ موارد مصرف:

- تصفیه کننده خون و مجاری عروقی.
- تقوی قلب و اعصاب.
- تقویت کننده و پایدار کننده عروق.
- تصفیه کننده و ترمیم کننده عروق.
- پیشگیری از عوارض پیری.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق نظر پزشک و یا ۲ قاشق غذاخوری بعد از هر وعده غذا میل نمایید.

■ عوارض جانبی:

گزارش نشده است.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- در افرادی که مشکلات مغز و اعصاب دارند منع مصرف دارد.
- محدودیت مصرف در بیماران دریافت کننده داروهای ضد انعقادی (وارفارین و...)
- بیماران با سابقه صرع و تشنج.
- در صورت حساسیت به هر یک از اجزاء فرآورده از مصرف آن خودداری فرمایید.
- به دلیل وجود ترکیبات گیاهی ایجاد رسوب در شریت عادی می باشد.
- قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید.

■ تداخلات دارویی:

گزارش نشده است.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:

به دلیل عدم مطالعات کافی، ممنوع است.

■ شرایط نگهداری:

دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰ °C) و دور از نور نگهداری کنید. دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



Safi Compound syrup

Ziziphus jujuba	Jujube	عُناَب
Cuscuta epithymum	Dodder	اَقْتِیْمون

مواد جانبی: گلاب، سرکه انگور، قند سفید.

شربت نیاک زیزیفوس اکسیمل

■ بسته بندی:

شربت در بطری‌های ۲۰۰ میلی‌لیتری در جعبه پرشوردار.

■ معرفی فرآورده:

عناَب دارای خواص ضد حساسیت، آرام بخش، مقوی و معمولاً در پیشگیری از بیماریهای کبدی و زخمهای گوارشی با منشاء عصبی مصرف زیادی دارد. اَقْتِیْمون گیاهی است که در گذشته بطور گسترده در درمان سردردهای عصبی، میگرن و در مجموع بیماری‌هایی که با منشا سودا بوده است، مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

■ این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۰/۸ درصد (وزنی/حجمی) پکتین استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:

عناَب به دلیل وجود cAMP و cGMP دارای خاصیت ضد حساسیت است و از بروز بثورات جلدی جلوگیری می‌کند.



■ موارد مصرف:

- درمان انواع جوش، آکنه و جميع امراض دُموی و ماشری.
- مسکن التهاب و تشنگی.
- موثر در حدت صفرا و خون.
- مفید در درمان اختلالات کبدی و تصفیه کننده خون.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق دستور پزشک و یا روزانه بصورت ناشتا ۲ تا ۴ قاشق غذاخوری در یک لیوان آب ولرم حل نموده و میل گردد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- در صورت مشاهده یا بروز هرگونه حساسیت به ترکیبات دارو از مصرف آن خودداری نمایید.
- در صورت وجود مشکلات گوارشی قبل از مصرف با پزشک متخصص طب سنتی مشورت نمایید.
- به دلیل وجود ترکیبات گیاهی ایجاد رسوب در شریت عادی می‌باشد.
- قبل از مصرف بطری را خوب تکان دهید.

■ تداخلات دارویی:

گزارش نشده است.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:

به دلیل عدم مطالعات کافی در این زمینه توصیه نمی‌گردد.

■ شرایط نگهداری:

دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.
دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰ °C) و دور از نور نگهداری کنید.



Niak Ziziphus oxymel
syrup

قرص نیاک فیت آیرون

<i>Terminalia chebula</i>	<i>Mirobalanus nigrae</i>	هليله سياه
<i>Terminalia chebula</i>	<i>Mirobalanus chebula</i>	هليله کابلی
<i>Phyllanthus emblica</i>	<i>Embelic myrobalan</i>	آمله
<i>Terminalia belerica</i>	<i>Beleric myrobalan</i>	بليله
<i>Piper nigrum</i>	<i>Black pepper</i>	فلفل سياه
<i>Piper longum</i>	<i>Long pepper</i>	دار فلفل
<i>Zingiber officinale</i>	<i>Ginger</i>	زنجبيل
<i>Cyperus rotundus</i>	<i>Sedge</i>	سعد کوفی
<i>Plumbago zeylanica</i>	<i>Leadwort</i>	شیطرح هندی
<i>Anethum graveolens</i>	<i>Dill seed</i>	تخم شویذ
<i>Nardostachys jatamansi</i>	<i>Muskroot</i>	سنبل الطیب
<i>Allium roseum</i>	<i>Leek</i>	تخم تره
	<i>Iron</i>	آهن

مواد جانبی: عسل، روغن بادام شیرین، شکر سرخ، ژلاتین، کربنات کلسیم، تالک.

- بسته بندی:
قرص گیاهی حاوی ۴ ورق پلیستر ۱۰ عددی در جعبه بروشوردار.
- معرفی فرآورده:
این محصول، فرآورده طب سنتی ایران است که حاوی گیاهان با مواد موثره مختلف مانند ترکیبات پلی فنولی، چیترو، پیپرین و غیره است که می تواند باعث بهبود عملکرد دستگاه گوارش شوند.
- این فرآورده براساس وجود حداقل ۵۰ میلی گرم یون آهن در هر قرص استاندارد شده است.
- این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۵ درصد ترکیبات فنولی تام برحسب گالیک اسید در هر قرص استاندارد شده است.
- مکانیسم اثر:
براساس اجزا تشکیل دهنده و مواد مطرح در منابع علمی در مورد آن ها، موارد ذیل می تواند توضیح دهنده اثرات در نظر گرفته شده برای این فرآورده در منابع طب سنتی باشد. در ساختار این فرآورده یون آهن وجود دارد که یکی از اجزای اصلی در تشکیل هموگلوبین است و باعث رفع کم خونی و بهبود انتقال اکسیژن در خون می شود که مورد نیکوکننده گونه می تواند اشاره به این مورد باشد. فلفل سیاه حاوی ماده موثره پیپرین است و بر اساس مطالعات این ماده باعث افزایش فراهمی زیستی داروها و همچنین افزایش عملکرد آنزیم های دستگاه گوارش می شود. آمله هادی آسکوربیک اسید و ترکیبات فنولی قابل توجهی است و می تواند باعث افزایش جذب آهن گردد. زنجبیل به دلیل وجود ماده موثره چیترو دارای خاصیت ضد تهوع است. سعد کوفی و تخم شویذ در پیشگیری از مشکلات گوارشی ناشی از آهن موثرند.
- موارد مصرف:
کم خونی ناشی از فقر آهن.
در طب سنتی بعنوان نیکو کننده رنگ رخسار(درمان آثمی) و مقوی احشاء و هاضمه مصرف می گردد.
- مقدار و نحوه مصرف:
طبق دستور پزشک و یا دو بار در روز، هر بار یک قرص میل شود.
- عوارض جانبی:
هموسیدروز (اختلال اضافه شدن بیش از نیاز آهن در نتیجه تجمع زیاد هموسیدرین).
ممکن است باعث مشکلات گوارشی شود که با توجه به مطالعات و تدابیر صورت گرفته، سعی شده این عارضه به حداقل برسد.
- موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:
این فرآورده برای افراد دچار تالاسمی ماژور، پرخونی منع مصرف دارد.
- در صورت وجود حساسیت به هریک از اجزای فرآورده، از مصرف دارو خودداری شود.
- برای جذب بهتر و کاهش اثرات جانبی بعد از غذا مصرف شود.
- هر قرص با یک لیوان آب کامل میل شود. از جویدن یا مکیدن قرص پرهیز شود چرا که ممکن است در روند جذب دارو تاثیر بگذارد.
- در صورت فراموش کردن مصرف قرص در یک وعده، دوز فراموش شده را در اولین فرصت میل کنید و قرص بعدی را در زمان معمول خود دریافت کنید.
- جهت مصرف در دوران بارداری، شیردهی و یا مصرف همزمان با داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک معالج یا دکتر داروساز مشورت نمایید.
- از مصرف مقادیر بیش از حد مجاز خودداری کنید و در صورت بروز هرگونه حساسیت به اجزای فرآورده از مصرف دارو پرهیز کنید.
- افراد با زخم های گوارشی، کولیت اولسراتیو و یا هیپاتیت به دلیل اثرات تحریکی آهن برروی مخاط دستگاه گوارش با احتیاط مصرف کنند.
- تداخلات دارویی:
در صورت استفاده از تتراسایکلین ها (آنتی بیوتیک)، آنتی اسیدها و پنی سیلایم ها پزشک معالج یا داروساز مشورت نمایید.
داروی حاوی آهن می تواند جذب لوودوپا، لوتیتروکسین، پنی سیلایم، کینولون ها و بیس فسفونات ها (مانند آلدروینیت) را کاهش دهد، بنابراین با حداقل دو ساعت فاصله زمانی مصرف گردد. به صورت همزمان با فرآورده های حاوی آهن و کلسیم مصرف نگردد.



Niak Phytiron
tablet



تداخلات غذایی:
احتمال دارد تاثیر دارو با مصرف تخم مرغ، شیر و مواد حاوی کافئین مثل چای و قهوه کاهش یابد.

■ مصرف در دوران بارداری و شیردهی:
توصیه می گردد با تجویز پزشک و با احتیاط مصرف گردد.

■ شرایط نگهداری:
دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.
دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید.

قرص

نیاک آلیکوم

پودر سیر ۳۰۰ میلی گرم *Allium sativum* Garlic

مواد جانبی: نشاسته دارویی، لاکتوز، استئارات منیزیم، سدیم کراس کارملوز، شکر، ژلاتین، کربنات کلسیم، تالک، تیتانیوم دی اکساید، پلی اتیلن گلیکول ۴۰۰۰، ستیل الکل.

■ بسته بندی:

قرص روکش دار حاوی ۳ ورق پلیستر ۱۰ عددی در جعبه بروشوردار.

■ این فرآورده براساس حداقل ۱۳۵۰ میکروگرم آلیسین در هر قرص استاندارد شده است.



■ موارد مصرف:

- پیشگیری از تصلب شرائین و کاهش عوارض ناشی از آن مانند: سرگیجه، فراموشی، زورز گوش، هیمینطور پادرد و یخ کردن دست و پا و خواب رفتگی اعضای بدن.
- کمک به کاهش چربی خون.
- کاهش خفیف فشارخون.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق دستور پزشک و یا روزی یک عدد قرص همراه با غذا میل گردد.

■ عوارض جانبی:

- ممکن است باعث ایجاد ناراحتی های گوارشی مانند نفخ و سوزش معده شود.
- احتمال بروز واکنش های آلرژیک و تغییر فلور میکروبی روده.
- در برخی موارد باعث افزایش زمان خونریزی می شود.

■ موارد منع مصرف و نکات قابل توصیه:

- در صورت وجود مشکلات انعقادی خون، در مصرف قرص سیر احتیاط نمایید و بهتر است با پزشک خود مشورت نمایید.
- در صورت وجود مشکلات گوارشی در مصرف این فرآورده احتیاط نمایید.
- به دلیل افزایش خطر خونریزی، مصرف این فرآورده را ۱۰ روز قبل از عمل جراحی قطع نمایید.
- در صورت حساسیت به اجزای فرآورده از مصرف آن خودداری گردد.

■ تداخلات دارویی:

از مصرف همزمان این فرآورده با وارفارین، ایزونیازید، داروهای ضد ویروس مهارکننده آنزیم reverse transcriptase (دسته دارویی NNRTIs) و سیکلوسپورین خودداری نمایید.

■ مصرف در شیردهی و بارداری:

- مصرف این فرآورده در دوران بارداری مجاز است اما بهتر است قبل از مصرف با پزشک متخصص مشورت شود.
- مصرف این فرآورده در دوران شیردهی می تواند موجب تغییر طعم شیر گردد.

■ شرایط نگهداری:

دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید.
دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



Niak Alicom
Tablet

قرص تبوکان

Ginkgo biloba

Ginkgo

عصاره خشک برگ گیاه جینکو

مواد جانبی: لاکتوز، میکروکریستالین سلولز، نشاسته ذرت، تالک، استئارات منیزیم، سیلیکون دی اکساید، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰، پلی اتیلن گلیکول ۴۰۰، اکسید آهن قرمز، دی اکسید تیتان.

■ بسته بندی:

قرص روکش دار حاوی ۳ ورق پلیستر ۱۰ عددی در جعبه بروشوردار.

■ معرفی فرآورده:

جینکو یکی از قدیمی ترین گونه های درختی است که تاکنون به حیات خود ادامه داده است. این گیاه ریشه در چین دارد و در قرن ۱۸ میلادی به اروپا وارد شده است. هر قرص تبوکان حاوی ۴۰ میلی گرم عصاره خشک و خالص شده برگ های گیاه *Ginkgo biloba* است. گیاه جینکو حاوی مواد موثره متعددی از جمله فلاونوئیدها است و توان آنتی اکسیدانی بالایی دارد.

■ - این فرآورده براساس ۸/۸ - ۱۰/۸ میلی گرم فلاونوئید بر حسب فلاوون گلیکوزید در هر قرص استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:

جینکو حاوی مواد موثره متعددی از جمله فلاونوئیدها، پروآنتوسیانیدین ها، لاکتون دی ترین ها مانند جینکولیدها است و توان آنتی اکسیدانی بالایی دارد و از ایسکمی جلوگیری می کند. این گیاه از پراکسیداسیون لیپیدها که باعث تخریب بافت ها، عروق و نورون ها می شود جلوگیری می کند همچنین باعث افزایش خورسانی به اندام ها مانند مغز می شود. این گیاه اثرات اسپاسمولیتیک با تاثیر مستقیم بر گیرنده های آلفا-آدرنرژیک دارد. جینکولید B باعث مهار فاکتور فعال کننده پلاکتی (PAF) می شود.



■ موارد مصرف:

- بهبود عملکرد مغز و تقویت حافظه.
- بهبود تعادل در اختلال ضعف تعادلی.
- سرگیجه و وزوز گوش با منشأ عروقی.
- لنگش متناوب.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق دستور پزشک و یا ۳ بار در روز، هر بار ۱ عدد قرص مصرف گردد.

■ عوارض جانبی:

تاکنون عارضه خاصی گزارش نشده اما در موارد نادر می تواند باعث مشکلات گوارشی، حساسیت و سردرد شود.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- در افراد با سابقه حساسیت بالا به فرآورده های جینکو مصرف نگردد.
- در افراد دارای ریسک خونریزی داخل جمجمه ای منع مصرف دارد.
- مصرف طولانی مدت آن در افراد دچار ریسک خونریزی توصیه نمی شود زیرا می تواند زمان خونریزی را افزایش دهد.
- اثرات داروهای مهار کننده تجمع پلاکت ها در مصرف همزمان با این دارو تشدید می گردد.

■ تداخلات دارویی:

اثرات داروهای مهارکننده تجمع پلاکت ها و ضد انعقاد خون در مصرف همزمان با این دارو تشدید می گردد.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف نگردد، مگر با تجویز پزشک.

■ شرایط نگهداری:

در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری شود. دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



TebokaN
Tablet

کیپسول ذیابیطس

<i>Bambusa bambos</i>	Tabasheer	طباشیر
<i>Glycyrrhiza glabra</i>	Liquorice	شیرین بیان
<i>Lactuca sativa</i>	Lettuce	تخم کاهو
<i>Portulaca oleraceae</i>	Purslane	تخم خرفه
<i>Rosa damascena</i>	Red rose	گل سرخ
<i>Coriandrum sativum</i>	Coriander	گشنیز
<i>Acacia arabica</i>	Gum arabic	صمغ عربی
<i>Santalum album</i>	Sandal wood	صندل سفید
<i>Punica granatum</i>	Pomegranate flower	گلنار
<i>Cinnamomum camphora</i>	Camphore	کافور
	Armenian clay	گل ارمنی

مواد جانبی: گلاب

■ بسته بندی:

۶۰ عدد کیپسول در بسته‌بندی قوطی در جعبه برشوردار.

■ معرفی فرآورده:

ذیابیطس را در طب ایرانی یک بیماری با علائم تشنگی دائم، پرنوشی و پر ادراری تعریف کرده‌اند. در قرن های بعدی کشف شد که قند بیماران در این بیماری بالا می رود و آن را به اختلال در ترشح انسولین توسط سلول های پتا جزایر لانگرهانس در پانکراس نسبت داده‌اند. در طب ایرانی ذیابیطس را به دو نوع گرم و سرد تقسیم کرده اند. در نوع گرم علائمی مانند تشنگی شدید، تکرر ادرار و احساس گرمی در کلیه ها وجود دارد.

■ - این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۵/۰ درصد ترکیبات فنلی بر حسب گالیک اسید استاندارد شده است.



■ موارد مصرف:

- کمک به درمان دیابت نوع گرم.
- کاهش عوارض مربوط به بیماری مانند پلی اوری.
- کمک به کاهش قند خون.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق دستور پزشک و یا ۳ بار در روز هربار یک کیپسول میل گردد.

■ عوارض جانبی:

- کاهش میل جنسی و باروری.
- در صورت مصرف طولانی مدت ممکن است منجر به افزایش فشارخون، سردرد و ضعف ماهیچه‌ها گردد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- در صورت بروز هرگونه حساسیت به اجزای فرآورده از مصرف آن خودداری فرمایید.
- در صورت استفاده از داروهای دیگر پائین آورنده قند خون از قطع ناگهانی آن داروها خودداری شود و به تدریج با بررسی سطح قند خون از مصرف داروها کاسته شود.
- مصرف مداوم و هر روزه دارو حداکثر ۴۰ روز است و بین دوره‌های مصرف، دوره استراحت ۲۰ روزه قرار گیرد.
- در افراد دچار نارسایی احتقانی قلبی، پرفشاری خون و بیماری کلیوی احتیاط مصرف دارد و حتما تحت نظر پزشک مصرف گردد.
- جهت اثر بخشی بهتر دارو، همراه با یک لیوان آب انار ترش میل شود.
- بهتر است مصرف این دارو دو هفته قبل از عمل های جراحی قطع شود.
- از مصرف همزمان این دارو با خانواده فاباسه شامل نخودفرنگی، عدس، ماش و ... خودداری شود.

■ تداخلات دارویی:

این فرآورده همراه با کورتیکواستروئیدها، دیگوسکسین، آب گریپ فروت و وافیان مصرف نگردد.

■ مصرف در بارداری:

ممنوع می‌باشد.

■ مصرف در دوران شیردهی:

استفاده از فرآورده به دلیل تغییر در طعم شیر توصیه نمی‌گردد، مگر طبق دستور پزشک معالج.

■ شرایط نگهداری:

دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید. دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



**Diabetes
capsule**

کیپسول نیاک بزوار

<i>Santalum album</i> L	White sandalwood	مندل سفید
<i>Rose damascena</i>	Rose water	گللاب
<i>Mineral Bezoar(serpentine)(SiO₂, Fe O₂, MgO)</i>		سنگ پادزهر معدنی
<i>Pearl (CaCO₃)</i>		مروارید ناسفته

■ بسته بندی:
حاوی ۱۰۰ عدد کیپسول در هر قوطی در جعبه بروشوردار.

■ معرفی فرآورده:
ترکیبی است سرشار از مواد معدنی از قبیل سنگ پادزهر معدنی که نوعی تالک شیبست غنی از املاح آهن و منیزیم می باشد. کلیه مواد و ترکیبات، خاصیت جاذب و دافع سموم داشته و به دلیل وجود املاح و ترکیباتی مانند آهن، کلسیم و منیزیم مقوی قلب و مغز نیز می باشد.

■ - این فرآورده بر اساس حداقل ۱۰% کلسیم کربنات در هر کیپسول استاندارد گردیده است.
- این فرآورده بر اساس حداقل ۰/۲% Fe O₂ در هر کیپسول استاندارد گردیده است.

■ مکانیسم اثر:
سیلیکات ها به دلیل قدرت جذب سطحی، سموم را از بدن جذب نموده و در نهایت آن ها را از طریق گوارش و یا سیکل انتروهپاتیک دفع می نماید.



موارد مصرف:
تقویت قلب و دماغ (مغز)، دافع سموم از قلب و دماغ.


■ مقدار و نحوه مصرف:
طبق دستور پزشک و یا روزانه ۱ الی ۲ کیپسول میل شود.

■ عوارض جانبی:
ممکن است باعث یبوست گردد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:
- در صورت وجود حساسیت به هر یک از اجزای فرآورده از مصرف دارو خودداری شود.
- با مایعات فراوان مصرف گردد.
- در صورت داشتن سابقه سنگ کلیه، قبل از مصرف با پزشک متخصص مشورت گردد.
- تجویز توسط متخصص طب سنتی الزامی است.
- به دلیل وجود کلسیم، همزمان با برخی آنتی بیوتیک ها مانند تتراسایکلین و ضد اسپدها مصرف نگردد.
- بهتر است همراه با آب سیب میل گردد.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:
به دلیل عدم مطالعات کافی در این زمینه توصیه نمی گردد مگر با تجویز پزشک.

■ شرایط نگهداری:
دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید.
دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.



Niak bezoar
capsule



شربت نیاک
زیزیفوس اکسیمل



قرص سیمپل تریپ



کپسول فوما اگزکیور



کامیل کرم



محلول لادن مرکب



برگشت به فهرست اصلی

Ziziphus jujuba	Jujube	عناّب
Cuscuta epithymum	Dodder	اقتیمون

مواد جانبی: گلاب، سرکه انگور، قند سفید.

شربت نیاک زیزیفوس اکسیمل

■ بسته بندی:

شربت در بطری‌های ۲۰۰ میلی‌لیتری در جعبه پرشوردار.

■ معرفی فرآورده:

عناّب دارای خواص ضد حساسیت، آرام بخش، مقوی و معمولاً در پیشگیری از بیماریهای کبدی و زخمهای گوارشی با منشاء عصبی مصرف زیادی دارد. اکتیمون گیاهی است که در گذشته بطور گسترده در درمان سردردهای عصبی، میگرن و در مجموع بیماری‌هایی که با منشا سودا بوده است، مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

■ این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۰/۸ درصد (وزنی/حجمی) پکتین استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:

عناّب به دلیل وجود cAMP و cGMP دارای خاصیت ضد حساسیت است و از بروز بثورات جلدی جلوگیری می‌کند.



■ موارد مصرف:

- درمان انواع جوش، آکنه و جميع امراض دموى و ماشرى.
- مسكن التهاب و تشنگى.
- موثر در حدت صفرا و خون.
- مفيد در درمان اختلالات کبدى و تصفيه کننده خون.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق دستور پزشک و یا روزانه بصورت ناشتا ۲ تا ۴ قاشق غذاخوری در یک لیوان آب ولرم حل نموده و میل گردد.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- در صورت مشاهده یا بروز هرگونه حساسیت به ترکیبات دارو از مصرف آن خودداری نمایید.
- در صورت وجود مشکلات گوارشی قبل از مصرف با پزشک متخصص طب سنتی مشورت نمایید.
- به دلیل وجود ترکیبات گیاهی ایجاد رسوب در شریت عادی می‌باشد.
- قبل از مصرف بطری را خوب تکان دهید.

■ تداخلات دارویی:

گزارش نشده است.

■ مصرف در بارداری و شیردهی:

به دلیل عدم مطالعات کافی در این زمینه توصیه نمی‌گردد.

■ شرایط نگهداری:

دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.
دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰ °C) و دور از نور نگهداری کنید.



Niak Ziziphus oxymel
syrup

قرص

سیمپل تریپ

<i>Terminalia chebula</i>	Mirobalanus citrina	هلیله زرد
<i>Terminalia chebula</i>	Mirobalanus nigrae	هلیله سیاه
<i>Terminalia chebula</i>	Mirobalanus chebula	هلیله کابلی
<i>Terminalia belerica</i>	Beleric myrobalan	بليله
<i>Phyllanthus emblica</i>	Embellic myrobalan	آمله

مواد جانبی: عسل، روغن بادام شیرین، منیزیم استئارات، سیلیکون دی اکساید، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز

- بسته بندی: ۱۰۰ عدد قرص در بسته بندی قوطی در جعبه بروشوردار.

■ معرفی فرآورده: اطریشل معرب کلمه تری پهلای (Triphala) هندی بوده که به ترکیبات حاوی هلیله، بليله و آمله گفته می‌شده است. در طب سنتی جهت ضعف معده، بواسیر، تقویت مغز استفاده شده و گفته می‌شود مانع از سفید شدن موی سر و عامل نیکو کردن رنگ رخساره و موجب دفع رطوبات به ویژه بلغم شده و به هضم غذا کمک می‌کند.

- این فرآورده براساس حداقل ۴٪ ترکیبات فنولی تام برحسب گالیک اسید استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر: هلیله حاوی ترکیبات تاننی فراوان مانند چپولازیک اسید و چپولنیک اسید، پلی‌فنول‌ها و اسیدهای میوه و اسیدهای چرب است و اثرات آنتی اکسیدانی مناسبی از خود بروز می‌دهد. بليله نیز دارای تانن و ترکیبات فنولی است و اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریال از خود نشان می‌دهد. آمله حاوی آسکوربیک اسید (ویتامین ث) و ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی است و توان آنتی اکسیدانی بالایی دارد و طبق برخی مطالعات می‌تواند به تشکیل موکوس در دستگاه گوارش کمک کرده و باعث بهبود زخم های گوارشی شود. توان آنتی اکسیدانی بالای این دارو که بیشتر مرتبط با ترکیبات تاننی و فنولی می‌باشد باعث می‌شود آمینواسیدها و آنزیم های دخیل در فرایندهای رشد مو و تولید رنگدانه کمتر مورد آسیب قرار بگیرند به خصوص آسیب ناشی از رادیکال های آزاد و گونه های فعال اکسیژن. در مطالعه‌ای مشخص شد مصرف فرآورده‌های حاوی ترکیبات تاننی باعث جذب بیشتر متیونین و افزایش کاربرد سیستم در واکنش‌های بیوسنتز بدن می‌شوند و این دو آمینواسید در فرایندهای مرتبط با بهبود وضعیت پوست و مو در بدن دخیل هستند.

روغن بادام شیرین حاوی اسیدهای چرب مانند اولئیک اسید و لینولئیک اسید می‌باشد و اثرات ملین و پوشانندگی دارد.



- موارد مصرف:
- مقوی معده و ضد نفخ
 - کمک در درمان التهاب روده و روده تحریک پذیر (IBS).
 - مانع از سفید شدن موی سر
 - کمک به شادابی پوست

- مقدار و نحوه مصرف: طبق دستور پزشک و یا هر ۸ ساعت ۲ عدد قرص مصرف گردد. (بیشینه مصرف ۱۰ عدد قرص می‌باشد)

- عوارض جانبی: نفخ و کرامپ شکمی و لینت خفیف که در صورت بروز معمولاً در ادامه درمان کاهش یافته یا برطرف می‌گردد.

- تداخلات دارویی: موجب تشدید اثر داروهای ملین و مسهل می‌گردد.

- موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه: در صورت وجود حساسیت شناخته شده به هریک از اجزای فرآورده از مصرف آن خودداری فرمائید.
- در صورت مصرف همزمان با داروهای ملین، دوز داروها کاهش یابد.
- دوره درمان حداقل ۴-۸ هفته می‌باشد، لذا مصرف دارو را تا پایان دوره درمان بطور منظم مصرف نمائید.
- در صورت فراموش نمودن یک دوز، دوز بعدی را در زمان خود مصرف نموده و از افزایش دوز بعدی اجتناب نمائید.

- مصرف در بارداری: طبق نظر پزشک معالج مصرف گردد.

- مصرف در شیردهی: ممکن است موجب تغییر در طعم شیر گردد. در مواردی ممکن است موجب لینت مزاج شیرخوار گردد.

- شرایط نگهداری: دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید. دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.



Simple trip
tablet

کپسول

فوما اگزکیور

<i>Terminalia chebula</i>	<i>Mirobalanus citrina</i>	هلیله زرد
<i>Terminalia chebula</i>	<i>Mirobalanus nigrae</i>	هلیله سیاه
<i>Terminalia chebula</i>	<i>Mirobalanus chebula</i>	هلیله کابلی
<i>Terminalia bellerica</i>	<i>Belleric myrobalan</i>	بللیله
<i>Phyllanthus emblica</i>	<i>Emblic myrobalan</i>	آمله
<i>Fumaria officinalis</i>	<i>Fumitory</i>	شاهتیره
<i>Cassia angustifolia</i>	<i>Senna</i>	سنا
<i>Rheum palmatum</i>	<i>Rhubarb</i>	ریوند چینی
<i>Tamarix nilotica</i>	<i>Athel tamarix</i>	گز علفی

مواد جانبی: کشمش سبز، روغن بادام شیرین.

■ بسته بندی:

۱۰۰ عدد کپسول در بسته بندی قوطی در جعبه برشوردار.

■ معرفی فرآورده:

اثریفل معرب کلمه تری پهلای (Triphala) هندی بوده که به ترکیبات حاوی هلیله، بللیله و آمله گفته می شده است. فوماتریپ با اثریفل شاهتیره علاوه بر گیاهان مذکور، حاوی گیاهانی از قبیل شاهتیره، ریوند و گز می باشد که موجب اصلاح کار کبد و بهبود عملکرد بافت پوست می گردند. ضمناً گیاهانی مانند سنا و ریوند ملین بوده که موجب دفع مواد زائد شده و به اصلاح بافت پوست و کبد کمک می کنند.

در طب سنتی این فرآورده بعنوان درمان خارش، اگزما، التهاب و سرخی پوست، صفرابر و مدر استعمال می گردد، که در ادبیات طب سنتی به آنها چرب وحکه و سعه می گویند.

■ این فرآورده براساس وجود حداقل ۵ درصد ترکیبات فنی برحسب گالیک اسید استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:

بللیله دارای تانن و ترکیبات فنی است و اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریال از خود نشان می دهد. آمله حاوی آسکوربیک اسید (ویتامین ث) و ترکیبات فنی و فلاونویدی است و توان آنتی اکسیدانی بالایی دارد. شاهتیره به دلیل وجود مواد موثره ای مانند فوماریک اسید، استرهای فوماریک اسید و مونومیل فومارات می تواند باعث کاهش فعالیت عوامل التهاب زای سیستم ایمنی مانند سایتوکاین تایپ یک گردد و در بیماری های پوستی مانند پسوریازیس و اگزما مفید باشد.



■ موارد مصرف:

- درمان کننده خارش، اگزما، اگزما آتوپیک، التهاب های پوستی و سرخی پوست.
- حساسیت پوستی.
- مفید در درمان لک های پوستی.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق نظر پزشک و یا ۱۲-۸ کپسول در ۲ تا ۳ دوز منقسم در روز میل شود.

■ عوارض جانبی:

احتمال ایجاد لینت مزاج و کرامپ شکمی وجود دارد.

■ تداخلات دارویی:

مصرف طولانی مدت این فرآورده به دلیل وجود سنا می تواند با داروهای ضد آریتمی و دیگوسکین تداخل ایجاد کند.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- دوره درمان حداقل ۱ الی ۲ ماه می باشد، لذا دارو را تا پایان دوره درمان بطور منظم مصرف ننمائید.
- در صورت مصرف همزمان با داروهای ملین و مسهل، دوز داروها کاهش یابد.
- در صورت فراموش نمودن یک دوز، دوز بعدی را در زمان خود مصرف نموده و از افزایش دوز بعدی اجتناب ننمائید.
- در صورت وجود حساسیت به هریک از اجزاء فرآورده از مصرف آن خودداری گردد.

■ مصرف در بارداری:

به دلیل وجود سنا و ریوند مصرف در بارداری توصیه نمی شود.

■ مصرف در شیردهی:

ممکن است موجب تغییر طعم شیر شده و می تواند موجب لینت مزاج در نوزادان شود.

■ شرایط نگهداری:

دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید.
دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.



Fuma Eczecure
capsule

کامیل

کرم

مواد جانبی:

اسید استئاریک، ستیل الکل، گلیسرین مونو استئارات، اسپرماستی، پارافین مایع، شربت سوربیتول ۷۰٪، پروپیلن گلیکول، تری اتانول آمین، بوتیل هیدروکسی تولوئن (BHT)، متیل پارابن، پروپیل پارابن.

■ بسته بندی:

کرم در تیوب های ۳۰ گرمی در جعبه مقوایی برشوردار.

■ معرفی فرآورده:

این محصول حاوی عصاره گیاهی بابونه بوده و نام کامیل کرم از واژه Chamomile به معنی بابونه برگرفته شده است. این فرآورده بر اساس وجود حداقل ۵/۵ میلی گرم کامازولن در هر گرم از آن استاندارد شده است.

■ مکانیسم اثر:

مواد موثره موجود در این محصول شامل کامازولن، بیزابولول و فلاونوئیدها می باشد که این ها اثر مهارى بر آنزیم های ۵ - لیبواکسیژناز و سیکلواکسیژناز دارند و بنابراین تولید پروستاگلندین ها و لکوترین ها را که به عنوان عوامل التهاب زا شناخته شده اند متوقف می کند. اسپیرواتر از دیگر مواد موثره موجود در بابونه است که از دگرانوله شدن ماست سل ها جلوگیری می کند و در نتیجه مانع آزاد شدن هیستامین می گردد.



■ موارد مصرف:

نورودرماتیت، اگزماى آتوپیک، درماتیت سبوریه ای، اگزماى مزمن و حاد، حساسیت های پوستی تماسی، ترک های ناشی از خشکی پوست، سوختگی ناشی از آفتاب، ادرار سوختگی نوزادان، درماتیت تماسی و بهبود نیش گزیدگی حشرات. آثار فارماکولوژیک: باعث کاهش بیوسنتز میانجی های موثر در التهاب می گردد.

■ مقدار و نحوه مصرف:

طبق دستور پزشک و یا روزانه ۲ الی ۴ بار به صورت موضعی مصرف شود.

■ عوارض جانبی:

حضور لاکتون ها در ترکیبات تهیه شده از گل بابونه ممکن است سبب واکنش های آلرژیک در افراد حساس شود و گزارش هایی از درماتیت تماسی ناشی از محصولات بابونه اعلام شده است. باید توجه شود که موارد نادری از آلرژی به طور مشخص به بابونه آلمانی نسبت داده شده است.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

افرادی که به بابونه یا دیگر گیاهان این خانواده مانند کاسنی، بومادران، گل داوودی، گل میا و آرنیکا حساسیت دارند بهتر در مصرف این فرآورده احتیاط نمایند.

■ تداخلات دارویی:

تا کنون تداخلی گزارش نشده است.

■ مصرف در شیردهی و بارداری:

مجاز است اما بهتر است قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید.

■ شرایط نگهداری:

دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰ °C) و دور از نور نگهداری کنید. دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.



Kamil
cream

محلول لادن مرکب

<i>Tropaeolum majus</i>	Ladanum	صمغ لادن
<i>Adiantum capillus-veneris</i>	Maidenhair	پرسیاوشان
<i>Artemisia absinthium</i>	Wormwood	افسنطین
<i>Cymbopogon schoenanthus</i>	Laurel	برگ بو
<i>Myrtus communis</i> L	Myrtle oil	روغن مورد

■ بسته بندی:
محلول در بطری ۲۵۰ میلی لیتری در جعبه بروشوردار.

■ معرفی فرآورده:
این محصول حاوی عصاره گیاهان مختلفی است که نه تنها از دیرباز برای شادابی و تقویت مو و پوست مورد استفاده بوده بلکه امروزه و براساس تحقیقات متخصصین امر این تاثیرات به اثبات رسیده و مواد موثره مسئول آنها شناسایی شده اند.

■ مکانیسم اثر:
برگ و ساقه لادن از خود یک اولئورزین چسبناک معطر به نام لادانوم ترشح می‌کنند که از دیر باز به صورت موضعی در نواحی ملتهب و زخم ها استفاده می‌شده است و با توجه به تحقیقات امروزی و اثبات وجود روغن های فرار مانند آلفا پینن، سینئول، لیمونن و اسیدهای چرب در لادانوم و همچنین وجود ترکیبات فلاونویدی مانند کوئرستین و ترکیبات فنلی مانند گالیک و الازیک اسید در عصاره آبی آن، این اثرات تایید شده‌اند. همچنین اثرات آن بر بهبود رویش مو که در تحقیقات نشان داده شده است. پرسیاوشان نیز از قدیم در کنترل ریزش مو کاربرد داشته و امروزه نیز طی تحقیقات صورت گرفته مواد موثره مانند کافئیک اسید، گالیک اسید، روتین، ایزوکوئرستین، تانن و آدانتوسید (از مشتقات تری ترین) در این گیاه شناسایی شده اند و اثرات مثبت آن در کنترل ریزش مو نشان داده شده است.



■ موارد مصرف:
جلوگیری از ریزش مو، تقویت ریشه مو، جلوگیری از شکنندگی مو، افزایش دهنده رشد و رویش مو، جلوگیری از بوجود آمدن شوره در سر.

■ مقدار و نحوه مصرف:
طبق دستور پزشک و یا هفته ای ۲ الی ۳ بار، هر بار بعد از شستن موها محلول را به مدت یک ربع به موها آغشته نمایید و سپس با آب شستشو دهید .

■ عوارض جانبی:
تا کنون عارضه خاصی گزارش نشده است.

■ موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه :
- در صورت وجود هرگونه حساسیت به هر یک از اجزای فرآورده، از مصرف فرآورده خودداری فرمائید.
- قبل از استفاده محلول را به خوبی تکان دهید.
- وجود ذرات ریز معلق در فرآورده طبیعی بوده و دلیل آن ترکیبات موثره گیاهی می باشد که باعث اثر بخشی بهتر آن می‌شود.
- از تماس فرآورده با چشم و مخاط جلوگیری کنید. در صورت تماس فرآورده با چشم و مخاط، آن را با آب بشوئید.
- این فرآورده موضعی بوده و خوراکی نمی‌باشد.

■ مصرف در دوران بارداری و شیردهی:
مجاز می‌باشد.

■ شرایط نگهداری:
دارو را در دمای محیط (کمتر از ۳۰°C) و دور از نور نگهداری کنید.
دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.



Ladan
solution